

Scheda tecnica

MAJESTIK®

Insetticida biologico a base di maltodestrine per uso in arboricoltura, coltivazioni di bacche, orticoltura e colture ornamentali

Matières actives: 598 g/l Maltodextrine

Formulation: Concentrato solubile in acqua
(SL)

EMPLOI:ARBORICOLTURA:

Pero, melo: 2,5% (40 l/ha)

Acari tetranichidi

La dose indicata si applica a un volume di area fogliare di 10'000 m³ per ha. Assicurare una bagnatura minuziosa di tutte le parti della pianta al fine di ottenere una copertura uniforme e regolare. Il volume della miscela di trattamento deve essere di 1'500 à 2'000 l/ha. La concentrazione massima di **MAJESTIK** nella miscela di trattamento è del 2,5%. Per trattamenti con meno acqua, il dosaggio deve essere ridotto di conseguenza (per esempio 25 l di Majestik in 1000 l di acqua per ha).

BACCHE:

Fragole: 2,5% (25 l/ha)

Acari tetranichidi

Tempo d'attesa: 3 giorni

Le piante di fragole devono essere minuziosamente bagnate, compresa la pagina inferiore delle foglie. Applicare **MAJESTIK** con una quantità di miscela di 1'000 l/ha.

La dose indicata si riferisce ad uno stadio di « piena fioritura » e « inizio della colorazione rossa del frutto », 4 piante per m²; trattamento con una quantità standard di miscela di 1000 l/ha.

CULTURE ORTICOLE:

Melanzana, cetriolo, peperone dolce, pomodoro: 2,5%

afidi

acari tetranichidi

mosca bianca

Tempo d'attesa: 3 giorni

Zucchini, fagioli: 2,5% (25 l/ha)

afidi

acari tetranichidi

mosca bianca

Tempo d'attesa: 3 giorni

Le colture orticole devono essere minuziosamente bagnate, compresa la pagina inferiore delle foglie. La quantità di miscela deve essere di almeno 1'000 l/ha. Per le colture più voluminose (melanzana, cetriolo, peperone, pomodoro) la quantità di miscela deve essere aumentata fino a 1'500-2'000 l/ha.

PIANTE ORNAMENTALI:

Dosaggio: 2,5 %

Afidi delle foglie

Acari tetranichidi

Uso nelle colture da fiore, piante verdi e rosai. Effettuare 2 trattamenti con un intervallo di 4-7 giorni. Non applicare sui fiori. L'applicazione di **MAJESTIK** si effettua con una quantità di miscela di trattamento di 1'000 - 2'000 l/ha in funzione della grandezza della coltura.

OSSERVAZIONI GENERALI:

Tutte le parti della pianta devono essere bagnate uniformemente e regolarmente in tutte le parti, poiché **MAJESTIK** agisce unicamente per contatto. Assicurarsi di bagnare bene sia la superficie superiore che quella inferiore delle foglie, al fine di raggiungere con la miscela di trattamento anche i parassiti nascosti. Quando la temperatura diurna supera i 25°C, trattare con **MAJESTIK** unicamente alla sera.

I migliori risultati di efficacia con **MAJESTIK** si ottengono con condizioni climatiche secche. Dopo il trattamento non dovrebbe piovere per almeno un giorno, in modo che l'efficacia di **MAJESTIK** non venga ridotta.



Per un'efficacia ottimale, a volte è necessario ripetere l'applicazione con **MAJESTIK** dopo 4 – 7 giorni.

MAJESTIK agisce contro le ninfe e gli adulti di afidi e acari, e contro le uova, larve, crisalidi e adulti della mosca bianca.

SELETTIVITÀ:

MAJESTIK mostra un'eccellente selettività nei confronti delle differenti colture. La concentrazione del 2,5 % non deve essere superata.

Nelle colture ornamentali, prima di trattare grandi superfici, si raccomanda di testare la selettività su qualche foglia. I fiori non dovrebbero essere trattati, a causa dei possibili danni che sono stati per esempio già osservati su petali di ciclamino.

Applicazioni ripetute con **MAJESTIK** possono portare i frutti di pomodoro ad avere un aspetto appiccicoso. Questo è stato osservato solo su pomodoro.

MISCIBILITÀ:

MAJESTIK deve essere applicato da solo.

AUSILIARI:

MAJESTIK ha anche un'azione di contatto sugli ausiliari. Quando la miscela di trattamento è seccata, gli ausiliari non sono più disturbati ed è possibile effettuare nuovi rilasci. **MAJESTIK** non ha efficacia sulle uova di teflodromi.

CONDIZIONI GENERALI:

MAJESTIK è pericoloso per le api. Applicare solo alla sera, al di fuori del periodo di volo delle api sulle piante in fiore o che essudano melata (p.ex. colture, inerbimenti, infestanti, colture circostanti, siepi). Può essere impiegato in serra chiusa, solo se non sono presenti insetti impollinatori.

MODO D'AZIONE

MAJESTIK è un insetticida biologico di contatto con la materia attiva maltodestrina. Ha effetto solo sugli insetti parassiti colpiti direttamente dalla miscela di trattamento. Une efficacité n'est obtenue que sur les insectes ravageurs atteints directement par la bouillie de traitement. Pertanto una seconda applicazione è spesso necessaria per una efficacia totale.

L'attività di **MAJESTIK** è puramente fisica. A seguito di una buona bagnatura, gli insetti parassiti vengono completamente coperti da un film di maltodestrina. La maltodestrina secca e blocca la respirazione, provocando l'asfissia del parassita. Inoltre, la maltodestrina secca provoca la paralisi del parassita venuto in contatto con la miscela di trattamento.

L'efficacia è visibile molto rapidamente dopo il trattamento. Normalmente la massima efficacia si osserva già 2-4 ore dopo l'applicazione.

Maltodestrina è una sostanza prodotta naturalmente, attraverso l'estrazione e l'idrolisi dell'amido. Il prodotto è 100% biodegradabile.

IMBALLAGGIO

bottiglia da 20 l

INDICAZIONI DI PERICOLO E DI SICUREZZA:

Simboli e indicazioni di pericolo:

Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive EU.

Rispettare le istruzioni d'uso al fine di evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente.

Conservare lontano dalla portata dei bambini.

S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio

Le indicazioni riportate su questa scheda tecnica sono solo a titolo informativo. Rispettare scrupolosamente le informazioni riportate sugli imballaggi.

© Marchio registrato da Certis Europe BLV