

Scheda tecnica

VERITA®

Fungicida preventivo e penetrante per lottare contro la peronospora della vigna, del tabacco e delle colture orticole

Materie attive: 4,4% fenamidone
66,7% fosetil d'alluminio

Formulazione: WG – granulato idrodispersibile

IMPIEGO:VIGNA:

Dosaggio: 0,18% (1,5-2,9 kg/ha)
peronospora

Per la viticoltura, **VERITA** dev'essere sempre applicato in combinazione con **Phaltan WDG 0,1% (1,0-1,6 kg/ha)**.

Applicazione possibile prima, durante e dopo fioritura, al più tardi fino alla metà di agosto.

Il miscuglio **Phaltan WDG + VERITA** offre una buona efficacia secondaria contro il rossore parasitario e l'escoriosi, così come un'efficacia parziale contro la botrite. Questa miscela previene lo sviluppo di resistenze.

Applicare **VERITA** preventivamente ad intervalli di 10-12 giorni, al massimo 3 volte per anno. Adattare il periodo e la frequenza di applicazione alla pressione della peronospora. Seguire le indicazioni del servizio fitosanitario. **VERITA** conviene particolarmente al momento dove la crescita fogliare è intensa, a partire dallo stadio di prefioritura (Stadio H).

Il volume della poltiglia dev'essere adattato agli stadi di vegetazione conformemente alle raccomandazioni delle stazioni federali agronomiche. Se il volume di poltiglia applicato è inferiore alle raccomandazioni, si concentrerà maggiormente. Bisogna infatti utilizzare la stessa quantità di prodotto (dosaggio) come se si utilizzasse il volume d'acqua prescritto, e così facendo, allo stesso tempo, la concentrazione aumenta di conseguenza.

VERITA può venir applicato anche con l'elicottero 1 volta per anno e per parcella. Non applicare **VERITA** a meno di 20 m dalle acque di superficie.

ORTICOLTURA:

Insalate: 2,5 kg/ha
peronospora

Effettuare la prima applicazione nei 3-5 giorni seguenti alla piantagione. L'applicazione successiva è da eseguire dopo 10-14 giorni, in funzione della pressione della peronospora. Attenzione alle applicazioni in serra: i problemi di fitotossicità possono essere maggiori. Al massimo 3 applicazioni per anno. Tempo d'attesa: 3 settimane.

Rucola: 2,5 kg/ha
peronospora

Al massimo 3 applicazioni per anno. Tempo d'attesa: 3 settimane.

Cetrioli: 2,5 kg/ha
peronospora

In pieno campo e in serra. A partire del mese di giugno, trattare a 10-14 giorni d'intervallo. In caso di forte pressione, può essere necessario ridurre gli intervalli a 7 giorni. Tempo d'attesa : 3 giorni.

Zucchine: 2,5 kg/ha
peronospora

L'applicazione è da effettuare nel caso di rischio d'infezione e va ripetuta dopo 7-14 giorni. Al massimo 3 applicazioni per anno e per parcella. Tempo d'attesa : 3 giorni.

Melone, zucche commestibili: 2,5 kg/ha
peronospora

L'applicazione è da effettuare nel caso di rischio d'infezione e va ripetuta dopo 7-14 giorni. Al massimo 3 applicazioni per anno e per parcella. Tempo d'attesa: 7 giorni.

Pomodoro: 2,5 kg/ha
peronospora (*Phytophthora spp.*)

In pieno campo e in serra. Trattare ad un intervallo di 10-14 giorni. Tempo d'attesa: 3 giorni. Tenuto conto del breve tempo d'attesa, **VERITA** si presta



Omya (Schweiz) AG
AGRO

CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

bene per delle applicazioni subito prima della raccolta o durante la raccolta. Non applicare **VERITA** a meno di 20 m delle acque di superficie.

TABACCO:

Dosaggio: 2,5 kg/ha
peronospora

Trattare a 10-14 giorni d'intervallo in funzione della pressione della malattia. Al massimo 3 applicazioni per anno. Non applicare **VERITA** a meno di 20 m dalle acque di superficie.

MISCIBILITÀ:

In viticoltura, **VERITA** è miscelabile con gli insetticidi di **Mimic**, **Audienz**, **Reldan 40**, **Applaud** e **Kiron**, con i fungicidi **Legend**, **Sythane Viti 240**, **Elosal Supra**, **Héliosoufre S**, **Phaltan 80 WDG**, **Scala** et **Sumico**. Non mescolare **VERITA** con dei prodotti contenenti del rame, dell'olio oppure dei concimi fogliari contenenti azoto. Al massimo 3 partner di miscela.

In orticoltura, **VERITA** è miscelabile con i fungicidi contro l'oidio come **Sythane Viti 240**, **Elosal Supra**, **Heliosoufre S** e gli insetticidi **Audienz**, **Tepeki** e **Kiron**. Non mescolare **VERITA** con dei concimi liquidi.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA:

Mescolare al massimo 3 prodotti, quindi in viticoltura: **VERITA** + **Phaltan WDG** + 1 altro prodotto.

Prima di versare i prodotti, riempire la cisterna a due terzi con acqua. Importante: non fermare l'agitatore durante il trattamento. I granulati devono essere in seguito versati lentamente nella botte.

Rispettare l'ordine seguente per la preparazione della poltiglia (viticoltura):

A. Incominciare sempre da **Phaltan WDG**. Attendere che **Phaltan WDG** si sia completamente disciolto prima di aggiungere il prodotto seguente.

B. Aggiungere in seguito le sospensioni concentrate (SC), p.es. **Legend**, **Héliosoufre S**, **Scala**, **Audienz**, **Mimic**, **Baktur**, **Kiron**.

C. Quando la sospensione concentrata si è completamente disciolta, aggiungere finalmente **VERITA**.

D. Nel caso di miscele con una formulazione EC (p.es. **Sythane Viti 240**) al posto di una SC, bisogna rispettare l'ordine seguente: **1. Phaltan WDG**, **2. Verita**, **3. Sythane Viti 240**.

Nel caso che si mettano in soluzione dei granulati in un secchio, è importante di non mescolare per almeno 5 minuti.

Solamente dopo questo tempo d'attesa di 5 min., il prodotto è pronto per venir mescolato e poi versato nella botte.

MODO D'AZIONE:

Grazie alla combinazione di due materie attive, **VERITA** ha un effetto preventivo, antisporulante e parzialmente stoppante contro la peronospora. **VERITA** impedisce la penetrazione delle spore nel tessuto vegetale. **VERITA** riduce anche la formazione delle spore e la crescita del micelio all'interno delle foglie. Le infezioni di più di tre giorni non possono pertanto più venir completamente stoppate. **VERITA** protegge le parti della pianta cresciute dopo il trattamento.

Il **fenamidone** appartiene alla famiglia degli imidazolinoni. Possiede un effetto preventivo e antisporulante. Grazie alla sua azione translaminare, penetra nelle foglie fino alla loro pagina inferiore. Il **fenamidone** blocca la catena respiratoria nei mitocondri del fungo.

Il **fosetil d'alluminio** penetra rapidamente nel tessuto vegetale ed è ripartito in modo sistemico in tutta la pianta. Stimola inoltre le difese naturali della pianta e protegge le nuove crescite del vegetale.

VERITA è resistente al dilavamento dopo 1 ora dall'applicazione. **VERITA** risulta neutro per gli acari predatori.

VERITA non ha influsso negativo sul processo di fermentazione, né sulle caratteristiche organolettiche del vino, se impiegato conformemente alle raccomandazioni.

IMBALLAGGI: **sacchetti da 1 kg**
 cartoni da 10 x 1 kg

PERICOLO –RISCHIO –SICUREZZA

Simboli e indicazioni di pericolo:

Xi – Irritante.

N - Pericoloso per l'ambiente.

Fraasi R (rischi)

R36 Irritante per gli occhi.

R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

Frase S (sicurezza)

- S2 Conservare fuori della portata dei bambini.
- S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
- S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- S57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Le indicazioni menzionate sulle schede tecniche sono a scopo informativo. Come referenza valgono le istruzioni figuranti sui nostri imballaggi.

© Marchio registrato del gruppo Bayer