

Fiche technique

GERAMID® TOP / DIRAGER® S**Eclaircissage sur pommiers****Données concernant le dosage:**

Produkte	Geramid Top		Dirager S	
	ml/100 l	l/ha	ml/100 l	l/ha
Matière active	2,67% Naphtylacétamide (NAAm)		3,3% acide naphtylacétique (NAA)	
Période d'application	Fin floraison (Traitement optimal lorsque 3/4 des pétales sont tombés)		Quand les fruits ont atteint un diamètre moyen de 10-12mm.	
Volume d'eau*	1000 l/ha		1000 l/ha	
Produkte	ml/100 l	l/ha	ml/100 l	l/ha
Arlet	400	4,0	80	0,8
Ariwa	330	3,3		
Boskoop	290	2,9	60-70	0,6-0,7
Braeburn	2)	2)	70	0,7
Cox-Orange	220	2,2	60-70	0,6-0,7
Delcorf	140	1,4		
Diwa (Milwa)	460	4,6	80	0,8
Discovery	140	1,4		
Elstar	460	4,6	80	0,8
Fiesta	140	1,4		
Gala	2)	2)	70-90	0,7-0,9
Galmac	330	3,3	80	0,8
Glockenapfel	290	2,9	70-90	0,7-0,9
Gloster	400	4,0	-1)	-1)
Golden Delicious	460	4,6	70-90	0,7-0,9
Goldparmäne	290	2,9	70-90	0,7-0,9
Greenstar	400	4,0	80	0,8
Granny Smith	220	2,2	40-60	0,4-0,6
Gravensteiner	330	3,3	40-60	0,4-0,6
Idared	290	2,9	40	0,4
Iduna	460	4,6	80	0,8
James Grieve	140	1,4		
Jazz	330	3,3	60	0,6
Jerseymac	140	1,4	40-60	0,4-0,6
Jonagold	330	3,3	40-60	0,4-0,6
Jonathan	220	2,2	40-60	0,4-0,6
Julyred	220	2,2		
Kanzi	230-300	2,3-3,0	80	0,8 l
Kidd's Orange	220	2,2	40-60	0,4-0,6



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

Aufwandmengen	ml/100 l	l/ha	ml/100 l	l/ha
Kiku (Fuji)	330	3,3	80	0,8
Maigold	400	4,0	70-90	0,7-0,9
Mairac	330	3,3		
Mc Intosh	140	1,4		
Meran	290	2,9		
Opal	290	2,9	40	0,4
Pinova	330	3,3	80	0,8
Pink Lady	460	4,6	80	0,8
Primerouge	290	2,9	70-90	0,7-0,9
Red Delicious			1)	1)
Rubens (Gala x Elstar)	2)	2)	80	0,8
RubINETTE	330	3,3	80	0,8
Rubinola	330	3,3		
Spartan	400	4,0	40-60	0,4-0,6
Summerred	400	4,0	40-60	0,4-0,6
Tentation	460	4,6	80	0,8
Topaz	460	4,6	70-90	0,7-0,9
Vistabella	140	1,4	40-60	0,4-0,6
la plupart des variétés précoces	140	1,4		

Cellules vides: pas de données disponibles

* Quantité de bouillie idéale: 1000 litres par ha. Le **dosage par ha** doit être respecté scrupuleusement.

- 1) Une application de Dirager S sur Gloster et Red Delicious n'est pas conseillée.
- 2) Ne pas traiter les Braeburn, Rubens et les variétés du groupe de Gala avec Géramid Top.
- 3) Données françaises.

Conditions climatiques lors de l'intervention:

L'application devra s'effectuer par un temps couvert et une humidité relative élevée. La température optimale se situe entre 12-15°C, max 20°C

L'adjonction d'huile minérale ou de mouillant n'est pas nécessaire.

Les renseignements mentionnés dans cette fiche technique ne sont que des données générales. Respecter scrupuleusement les informations figurant sur les étiquettes.



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch