

Fiche technique

GERAMID® TOP / DIRAGER® S**Eclaircissage sur pommiers****Données concernant le dosage:**

Produkte	Geramid Top		Dirager S	
Matière active	2,67% Naphtylacétamide (NAAM)		3,3% acide naphtylacétique (NAA)	
Période d'application	Fin floraison (Traitement optimal lorsque 3/4 des pétales sont tombés)		Quand les fruits ont atteint un diamètre moyen de 10-12mm.	
Volume d'eau*	1000 l/ha		1000 l/ha	
Aufwandmengen	ml/100 l	l/ha	ml/100 l	l/ha
Arlet	400	4,0	80	0,8
Ariwa	330	3,3		
Boskoop	290	2,9	60-70	0,6-0,7
Braeburn	2)	2)	70	0,7
Cox-Orange	220	2,2	60-70	0,6-0,7
Delcorf	140	1,4		
Diwa (Milwa)	460	4,6	80	0,8
Discovery	140	1,4		
Elstar	460	4,6	80	0,8
Fiesta	140	1,4		
Gala	2)	2)	70-90	0,7-0,9
Galmac	330	3,3	80	0,8
Glockenapfel	290	2,9	70-90	0,7-0,9
Gloster	400	4,0	-1)	-1)
Golden Delicious	460	4,6	70-90	0,7-0,9
Goldparmäne	290	2,9	70-90	0,7-0,9
Greenstar	400	4,0	80	0,8
Granny Smith	220	2,2	40-60	0,4-0,6
Gravensteiner	330	3,3	40-60	0,4-0,6
Idared	290	2,9	40	0,4
Iduna	460	4,6	80	0,8
James Grieve	140	1,4		
Jazz	330	3,3	60	0,6
Jerseymac	140	1,4	40-60	0,4-0,6
Jonagold	330	3,3	40-60	0,4-0,6
Jonathan	220	2,2	40-60	0,4-0,6
Julyred	220	2,2		
Kanzi	2)	2)	80	0,8 l
Kidd's Orange	220	2,2	40-60	0,4-0,6



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

Aufwandmengen	ml/100 l	l/ha	ml/100 l	l/ha
Kiku (Fuji)	330	3,3	80	0,8
Maigold	400	4,0	70-90	0,7-0,9
Mairac	330	3,3		
Mc Intosh	140	1,4		
Meran	290	2,9		
Opal	290	2,9	40	0,4
Pinova	330	3,3	80	0,8
Pink Lady	460	4,6	80	0,8
Primerouge	290	2,9	70-90	0,7-0,9
Red Delicious			1)	1)
Rubens (Gala x Elstar)	2)	2)	80	0,8
RubINETTE	330	3,3	80	0,8
Rubinola	330	3,3		
Spartan	400	4,0	40-60	0,4-0,6
Summerred	400	4,0	40-60	0,4-0,6
Tentation	460	4,6	80	0,8
Topaz	460	4,6	70-90	0,7-0,9
Vistabella	140	1,4	40-60	0,4-0,6
la plupart des variétés précoces	140	1,4		

Cellules vides: pas de données disponibles

* Quantité de bouillie idéale: 1000 litres par ha. Le **dosage par ha** doit être respecté scrupuleusement.

- 1) Une application de Dirager S sur Gloster et Red Delicious n'est pas conseillée.
- 2) Ne pas traiter les Braeburn, Kanzi, Rubens et les variétés du groupe de Gala avec Géramid Top.
- 3) Données françaises.

Conditions climatiques lors de l'intervention:

L'application devra s'effectuer par un temps couvert et une humidité relative élevée. La température optimale se situe entre 12-15°C, max 20°C

L'adjonction d'huile minérale ou de mouillant n'est pas nécessaire.

Les renseignements mentionnés dans cette fiche technique ne sont que des données générales. Respecter scrupuleusement les informations figurant sur les étiquettes.