

Technische Informationen

SIVA 50

Biologisches Insektizid auf Basis von natürlichen Fettsäuren im Obst-, Beeren-, Gemüse- und Zierpflanzenbau

Wirkstoffe: 505 g/l Fettsäuren
(Kaliumsalze)

Formulierung: Suspensionskonzentrat (SC)

ANWENDUNG:

Pflanzen allseitig gut benetzen, da nur über den direkten Kontakt eine Wirkung vorhanden ist. Behandlung nach Bedarf wiederholen. Nach dem Anrocknen ist keine Wirkung mehr zu erwarten. Bei Tagestemperaturen über 25° C **SIVA 50** immer in den Abendstunden spritzen.

OBSTBAU:

Dosierung: 10-15 l/ha Blattläuse
Spinnmilben
Wartefrist: 1 Woche

Obstbäume gründlich benetzen, Brühmenge 800-1000 l/ha. Die Aufwandmenge von maximal 15 l/ha sollte im Obstbau aus Gründen der Verträglichkeit nicht überschritten werden. Die maximale Konzentration von **SIVA 50** in der Spritzbrühe beträgt 2%. Wird mit weniger Wasser gespritzt, muss die Aufwandmenge entsprechend reduziert werden (z.B. max. 8 l Siva 50 bei 400 l Wasser pro ha).

BEERENBAU:

SIVA 50 ist in den folgenden Beerenkulturen bewilligt: **Erdbeere, Brombeere, Himbeere, Heidelbeere, Ribes Arten, Mini Kiwi, Schwarzer Holunder.**

Dosierung: 2% (20 l/ha) Blattläuse
Spinnmilben
Wartefrist: 1 Woche

Die angegebene Konzentration im Beerenbau bezieht sich auf eine Basiswassermenge von 1000 l/ha. Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich für:

Erdbeeren auf Stadium Vollblüte bis Beginn Rotfärbung der Früchte, 4 Pflanzen pro m².

Brombeeren und Sommerhimbeeren auf Stadium 'Erste Blüten bis etwa 50% der Blüten offen'.

Herbsthimbeeren auf eine Heckenhöhe von 150-170 cm.

Heidelbeeren und Ribes Arten auf Stadium '50-90% der Blütenstände mit sichtbaren Früchten'.

Die Konzentration von 2% darf in allen Kulturen nicht überschritten werden, da sonst die Gefahr von Phytotoxschäden auf den Früchten und Blättern besteht.

Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen des BLW an das Stadium der zu behandelnden Kultur anzupassen.

GEMÜSEBAU:

Allgemein: 2% Blattläuse
Spinnmilben
Wartefrist: 1 Woche

Küchenkräuter: 2% (20 l/ha) Blattläuse
Spinnmilben
Wartefrist: 1 Woche

Aubergine, Bohnen, Gurken, Peperoni, Tomaten, Zucchini:
2% Weisse Fliege
Wartefrist: 1 Woche

Kohlarten (Freiland):
2% Weisse Fliege
Wartefrist: 1 Woche

Anwendungstipps zur Bekämpfung der Weissen Fliege im Kohlgemüse mit **SIVA 50**:

- Pflanzen allseitig gut benetzen, da Wirkung nur bei direktem Kontakt.
- Mit genügender, ans Kulturstadium angepasster Wassermenge fahren (bei einer Wassermenge von 1000 l/ha mit **SIVA 50** 20 l/ha fahren).



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

Die Angaben der technischen Merkblätter dienen zur Information. Massgebend sind die Gebrauchsanweisungen auf unseren Packungen.