

ALLE FUNGIZIDE IM GETREIDE AUF EINEN BLICK

BRONCO

Gewinnt jedes Duell gegen Getreidekrankheiten

Epoxiconazole 62.5 g/l, Fluxapyroxad 62.5 g/l

- Bärenstarke Wirkung gegen Septoria, Gelbrost und Braunrost
- Hervorragende vorbeugende Wirkung dank Wirkstoffdepot
- Stärkste abstoppende Wirkung
- Erfolgreiche Wirkstoffkombination für Höchstserträge

CASAC

Der Volltreffer für gesundes Getreide

Prothioconazole 125 g/l, Tebuconazole 125 g/l

- Vorbeugende und abstoppende Wirkung
- Lange Wirkungsdauer
- Breites Wirkungsspektrum (Rost-Arten, Septoria, Mehltau etc.)
- Starke Fusarienwirkung

ALLEGRO

Herausragend gegen Mehltau und Halmbruch

Kresoxim-methyl 125 g/l, Epoxiconazole 125 g/l

- Das ideale Fungizid für einen frühen Einsatz
- Schützt auch gegen Frühinfektionen von Rost und Septoria
- Greening-Effekt sorgt für vitalere Bestände
- Legt die Basis für erhöhte Erträge und maximale Qualität

SIROCCO


Der Massstab gegen Braunrost und Ährenfusarien

Metconazole 60 g/l


- Wirkt vorbeugend und abstoppend
- Anwendung direkt in die Blüte
- Sehr stark gegen Fusarien
- Mit langer Wirkungsdauer




Braunrost



Septoria-Blattflecken




Spelzenbräune




Mehltau



Ährenfusarien



Rhyncho-Blattflecken



Netzflecken



Sprenkelnekrosen



Getreidefungizide

Starke Strategien für gesundes Getreide



SICHER GEGEN ALLE GETREIDEKRANKHEITEN

Maximaler Schutz
Anwenderfreundlich
Optimal angepasst



Reg. Warenzeichen. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.

Omya (Schweiz) AG Agro Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41, Beratung 062 789 23 36, bestellung.agro@omya.com, www.omya-agro.ch

Fungizidstrategien



GEZIelt GEGEN ALLE KRANKHEITEN IM GETREIDE

Die modernen Omya-Fungizide schützen Sie sicher und zuverlässig gegen alle bekannten Getreidekrankheiten wie Septoria, Rostarten, Mehltau, usw. Mit der breiten Auswahl an starken Wirkstoffen haben Sie die Möglichkeit, die Fungizidstrategie gezielt nach Ihren Bedürfnissen zu wählen. Ihr Omya-Berater unterstützt Sie gerne für eine optimale und auf Ihren Standort angepasste Strategie.



BBCH 30 Beginn Schossen	BBCH 31 1-Knoten	BBCH 32 2-Knoten	BBCH 37 Letztes Blatt	BBCH 39 Fahnen- blatt- entwickelt	BBCH 45 Schwellen Blatt- scheide	BBCH 51 Beginn Ähren- schieben	BBCH 59 Ende Ähren- schieben	BBCH 61 Beginn Blüte	BBCH 69 Ende Blüte

WEIZEN: HALMBRUCH, BLATT- UND ÄHRENKRANKHEITEN

Strategie mit einer Behandlung				Bronco 2 l/ha						Bronco und Casac bekämpfen alle Blatt- und Ährenkrankheiten im Weizen, mit ertragssteigernder Wirkung. Der optimale Behandlungszeitpunkt liegt zwischen Stadium BBCH 39 und 51.
Intensive Strategie ohne Wirkung gegen Ährenfusarien		Allegro 1 l/ha				Bronco 2 l/ha oder Casac 1 l/ha				Allegro im Stadium BBCH 31–32 bekämpft neben Halmbruch auch frühe Infektionen mit Blattkrankheiten wie Braunrost und Septoria-Blattflecken. Allegro ist mischbar mit Wachstumsregulatoren.
Intensive Strategie mit starker Wirkung gegen Ährenfusarien				Bronco 2 l/ha					Casac 1 l/ha oder Sirocco 1,5 l/ha	Bronco im Stadium BBCH37–39 schützt gegen Blatt- und Ährenkrankheiten. Spritzungen gegen Ährenfusariosen mit Casac oder Sirocco müssen während der Blüte (BBCH 61–69) durchgeführt werden. Beste Wirkungen werden bei Behandlungen kurz vor oder nach dem Regen erzielt.

GERSTE: BLATTKRANKHEITEN

Strategie mit einer Behandlung				Casac 1 l/ha oder Bronco 2 l/ha						Bei Anwendungen bis im Stadium BBCH 39 können Casac oder Bronco zusammen mit Elotin angewendet werden.
Strategie mit zwei Behandlungen für Standorte mit Höchstserträgen	Allegro 1 l/ha				Casac 1 l/ha oder Bronco 2 l/ha					Vorlage von Allegro im Stadium BBCH 30–31 bei frühen Infektionen von Blattkrankheiten. Mischbar mit Wachstumsregulatoren. Casac oder Bronco in Mischung mit Elotin so spät wie möglich im Stadium 39 durchführen. Ohne Elotin spätestens im Stadium BBCH 51 anwenden.

ROGGEN UND TRITICALE: HALMBRUCH, BLATT- UND ÄHRENKRANKHEITEN

Strategie mit einer Behandlung						Bronco 1,8–2 l/ha				Bei einer Strategie mit einer Fungizidspritzung Behandlung bei Beginn Ährenschieben durchführen. Bei einer sehr intensiven Strategie Allegro im BBCH 31–32 vorlegen und zweite Spritzung mit Bronco oder Casac im Stadium BBCH 51–55 durchführen.
Intensive Strategie mit zwei Behandlungen	Allegro 1 l/ha					Bronco 1,8 l/ha oder Casac 1 l/ha				

ALLE FUNGIZIDE IM GETREIDE AUF EINEN BLICK

	Allegro	Amistar	Bronco	Casac	Legend	Sirocco
Bewilligte Anwendungen						
WEIZEN						
Halmbruch	•		•			
Braun- und Gelbrost	•	•	•	•		•
Echter Mehltau	•	•	•	•	•	•
Septoria	•	•	•	•		•
Ährenfusarien				•		•
GERSTE						
Netzflecken	•	•	•	•		•
Rhynchosporium	•	•	•	•		•
Echter Mehltau	•	•	•	•	•	•
Zwergrost	•	•	•	•		
Sprenkelnekrosen	•		•	•		
ROGGEN						
Braunrost	•	•	•	•		•
Halmbruch			•			
Echter Mehltau			•	•		
Rhynchosporium	•	•	•	•		
Septoria				•		
TRITICALE						
Halmbruch			•			
Echter Mehltau			•	•		
Rhynchosporium	•	•		•		
Braun- und Gelbrost	•	•	•	•		•
Septoria	•	•	•	•		•

volle Wirkung •
Teilwirkung ◐