



Arkaban[®]

Maximaler Schutz für Kartoffeln und Gemüse

*Stark gegen
Phytophthora und
Falschen Mehltau*

*Ausgezeichnet
gegen Alternaria*

*Wirkt vorbeugend,
abstoppend und
antisporeulierend*



Omya (Schweiz) AG
AGRO

CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

Vielfältige Wirkungsweise

Wirkstoffverteilung

Beide Wirkstoffe wirken auf der Blattoberfläche und dringen ins Pflanzeninnere ein. Fenamidon wird in den Blättern trans-laminar verteilt, während Propamocarb systemisch in Richtung Triebsspitzen transportiert wird.

Wirkungsweise

Beide Wirkstoffe verhindern auf der Blattoberfläche die Sporenkeimung. Im Blattinnern werden Myzelwachstum und die Bildung von Sporangienträger mit neuen Pilzsporen gestoppt.

- ⇒ starke vorbeugende Wirkung
- ⇒ starke kurative Wirkung
- ⇒ starke antisporeulierende Wirkung



Arkaban bekämpft die Entwicklung der Kraut- und Knollenfäule und des Falschen Mehltaus in vielfältiger Weise auf und in den Blättern.

Arkaban in Kartoffeln



Arkaban 2 l/ha

Arkaban ist ideal geeignet für Startspritzungen. Die Behandlungen erfolgen vorbeugend, vor einer möglichen Infektion. Arkaban ist bestens geeignet für Spritzfolgen mit Curzate M WG und Electis. In einer Spritzfolge werden maximal zwei aufeinanderfolgende Applikationen mit dem gleichen Produkt empfohlen.

Arkaban ist mischbar mit Audienz zur Bekämpfung des Kartoffelkäfers und den Flüssigdüngern Microplant, Maneltra Mg Plus und Maneltra Mn Plus.

Arkaban auf einen Blick

Wirkstoffe:	375 g/l Propamocarb 75 g/l Fenamidon
Formulierung:	Suspensionskonzentrat
Aufwandmenge:	2 l/ha
Applikationen:	max. 3 Behandlungen pro Kultur und Jahr
Spritzintervalle:	7-10 Tage

Die Vorteile von Arkaban

- ✦ Ausgezeichnet gegen Kraut- und Knollenfäule
- ✦ Exzellent gegen Falschen Mehltau
- ✦ Sehr gute Alternariawirkung
- ✦ Schützt Blätter und Früchte
- ✦ Regenfest nach 1 Stunde
- ✦ Schützt den Neuzuwachs
- ✦ Ausgezeichnete Verträglichkeit
- ✦ Zwei Wirkstoffe mit unterschiedlicher Wirkungsweise



Arkaban im Gemüse

Aufwandmenge: 2 l/ha

In schwer benetzbaren Kulturen wie Kohl, Lauch, Zwiebeln immer mit **Break-Thru 0,2 l/ha** anwenden.

Arkaban ist mischbar mit Insektiziden und mit Fungiziden gegen Blattflecken, Echten Mehltau, Botrytis.

Kulturen	Krankheiten	Wartefrist
Aubergine, Tomaten	Kraut- u. Fruchtfäule, Alternaria	3 Tage
Blumenkohle, Kopfkohle	Falscher Mehltau, Alternaria	2 Wochen
Gurken, Kürbisse mit genisssbarer Schale (Zucchetti, Patisson, Rondini)	Falscher Mehltau	3 Tage
Zwiebeln, Knoblauch, Schalotten	Falscher Mehltau	2 Wochen
Lauch	Falscher Mehltau, Purpurflecken (TW)	2 Wochen
Melonen, Speisekürbis	Falscher Mehltau	3 Tage
Rucola	Falscher Mehltau	2 Wochen
Salate	Falscher Mehltau	2 Wochen

