



**NEU**

# Firebird<sup>®</sup> Plus

Stark gegen Stockausschläge



**JETZT ALS PRAKTISCHE  
FERTIGFORMULIERUNG**

Schnell

Zuverlässig

Sehr gut verträglich

# Firebird<sup>®</sup> Plus

Stark gegen Stockausschläge

**NEU**

Jetzt als praktische  
Fertigformulierung



**Firebird Plus ist ein schnell wirkendes Kontaktherbizid zur Beseitigung von Stockausschlägen im Kern- und Steinobst sowie im Weinbau. Jetzt als praktische Fertigformulierung erhältlich.**

### Noch stärker mit viel Sonne

**Firebird Plus** ist ein reines Kontaktherbizid. Es wird nur über die grünen Pflanzenteile aufgenommen und wird in der Pflanze nicht systemisch verteilt. Der Wirkstoff Pyraflufen benötigt die Energie der Sonneneinstrahlung für seine Aktivität. Die Wirkung von **Firebird Plus** wird bei starker Sonneneinstrahlung gesteigert.

### Schnell und zuverlässig

Pyraflufen hemmt die Chlorophyllbildung in den Blättern der Stockausschläge. Bereits nach 2–3 Tagen sind Blattverbräunungen und abgestorbenes Pflanzengewebe sichtbar.

**Firebird Plus** weist zusätzlich eine Nebenwirkung auf viele breitblättrige Unkräuter auf. Gräser werden nicht erfasst. Grasbegrünungen in den Rebbergen werden nicht geschädigt.

### Sehr gut verträglich

Bei korrekter Anwendung ist **Firebird Plus** sehr gut verträglich. Da der Wirkstoff Pyraflufen keine systemische Wirkung besitzt, ist ein Wirkstofftransport über die Schosser zu den Obstbäumen bzw. Rebstöcken nicht möglich.



## Anwendung

- Dosierung:** 0,5%  
**Firebird Plus** ist eine praktische, gebrauchsfertige Formulierung. (Es muss kein Fireoil mehr zugemischt werden).
- Brühmenge:** 300–500 l Wasser pro ha behandelte Fläche.  
Die Stockausschläge müssen vollständig benetzt werden.  
Das ergibt eine Spritzbrühe mit ca. 1,5–2,5 l **Firebird Plus** pro ha.
- Zeitpunkt:** Erste Behandlung auf 10–15 cm, maximal 20 cm lange Stockausschläge. Maximal 2 Behandlungen pro Jahr, ab dem 3. Standjahr der Obstbäume bzw. Rebstöcke.
- Hinweise:** Die Anwendung darf nur im unteren Stammbereich auf vollständig von der Rinde geschützte Stämme durchgeführt werden. Abdrift auf höher gelegene Pflanzenteile müssen vermieden werden. Nur bei sonnigem und windstillem Wetter behandeln. Es wird empfohlen, bei der Behandlung abdriftmindernde Injektordüsen einzusetzen.



Symptome 2 Tage nach der Behandlung mit **Firebird Plus**

