



# Simplex<sup>®</sup>

Einfach das Beste gegen Blacken



**ZERSTÖRT DIE BLACKEN  
BIS IN DIE WURZELN**

Schnell  
Sicher  
Dauerhaft

# MIT VOLLER WUCHT GEGEN BLACKEN

**Simplex** wirkt sicher und schnell gegen Blacken und andere schwer bekämpfbare Unkräuter in Wiesen und Weiden, in Nichtkulturland und in Ökoausgleichsflächen.

Durch die rasche systemische Verlagerung der Wirkstoffe bis tief in die Wurzeln werden die Unkräuter zerstört und der Wiederaustrieb nachhaltig verhindert.

## Überzeugende Argumente für Simplex

- **Sehr schnelle Wirkstoffverteilung in der ganzen Pflanze**
- **Zerstört die Wurzeln, Pflanzen sterben rasch ab**
- **Verhindert nachhaltig den Wiederaustrieb**
- **Bereits nach einer Stunde regenfest**
- **Hervorragende Dauerwirkung**



## Simplex im Überblick

Wirkstoff:	100 g/l Fluroxypyr-meptyl 30,1 g/l Aminopyralid
Formulierung:	Anwenderfreundliche Mikroemulsion (ME): - sehr homogene Verteilung - sehr stabile Formulierung
Einsatz:	Einzelstockbehandlung. Im Frühling oder Sommer bis Ende August.
Fruchtfolge:	Nach der Anwendung von Simplex können problemlos Getreide, Futtergräser oder Mais nachgebaut werden.

## Simplex Farbstoff

**NEU**

Mit **Simplex** mischbarer, weisser Farbstoff (Kaolin) zur Kennzeichnung der gespritzten Blacken.

Anwendung: 5 g **Simplex Farbstoff** pro 1 l Spritzbrühe.

- Mit Rückenspritze (10 l): 50 g (2 gut gehäufte Messlöffel) **Simplex Farbstoff** der Spritzbrühe beimischen.

- Mit Handspritzgerät (1 l): 5 g (1/4 gehäufte Messlöffel) **Simplex Farbstoff** der Spritzbrühe beimischen.

- Mischreihenfolge: Zuerst **Simplex**, dann **Simplex Farbstoff**



Behandelte Wiese ein Jahr nach der Anwendung gegen Blacken. Links die unbehandelte Kontrolle, rechts der behandelte Abschnitt.

## Erfolgreiche Blackenbekämpfung

Die Behandlung gegen Blacken erfolgt im Rosettenstadium (genügend Blattmasse für eine maximale Wirkstoffaufnahme).

Die Blacken müssen sich in einer aktiven Wachstumsphase befinden, damit der Wirkstoff rasch in der ganzen Pflanze verteilt wird.

Nicht auf geschwächte oder verschmutzte Pflanzen (Gülle, Mist) anwenden.

**Simplex** dringt bis tief in die Wurzelspitzen vor, zerstört das Wurzelmaterial und verhindert aktiv den Wiederaustrieb.

## Anwendungsempfehlungen

### Wiesen und Weiden

Rückenspritze:	0,5%	Blacken, Grosse Brennnessel
	1%	Brombeersträucher, Disteln, Japanischer Knöterich, Giftige Kreuzkräuter

Handspritzgeräte:	2,5%	Blacken
-------------------	------	---------

Ganze Pflanze gut benetzen.

Bei Handspritzgeräten ca. 4-5 ml Brühe pro Pflanze.

### Nichtkulturland

Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen:

0,5%	Blacken, Grosse Brennnessel
1%	Ambrosia, Brombeersträucher, Disteln, Japanischer Knöterich, Giftige Kreuzkräuter

### Ökoausgleichsflächen

Grünflächen:	0,5%	Blacken
	1%	Brombeersträucher, Disteln, Jap. Knöterich, Giftige Kreuzkräuter
Offene Ackerfläche:	0,5%	Blacken
	1%	Disteln, Japanischer Knöterich, Giftige Kreuzkräuter

