



Picobello®

Contre orties, chardons, rumex et ronces



POUR UN DÉSHERBAGE DURABLE

Rapide et puissant

Produit systémique

Très bonne sélectivité sur graminées

DER GARANT GEGEN HARTNÄCKIGE PROBLEMUNKRÄUTER

Picobello est un herbicide foliaire sélectif pour lutter contre les adventices difficiles à combattre, comme par exemple les orties dioïques, chardons, rumex et ronces dans les prairies et pâturages, dans les talus et les bandes enherbées le long des routes, ainsi que sur les surfaces de compensation écologique.

Profil de produit

Matières actives: 240 g/l triclopyr, 60 g/l clopyralide

Formulation: Émulsion concentrée (EC)

Culture de remplacement:

Une mois après le traitement d'une prairie ou d'un pâturage et suite à un labour, on peut semer des céréales, du maïs ou un mélange de graminées.

Après 6 mois, on peut semer des betteraves, des tournesols, du colza ou des légumineuses.

Domaine d'utilisation

Prairie et pâturage: Orties dioïques, chardons, ronces, rumex

Talus et bandes vertes, friche, dépôt de terre végétale:

Orties dioïques, ronces, chardons et rumex uniquement en friche

Surfaces herbagères*: Chardon des champs, ronces, rumex

Terres ouvertes*: Chardon des champs, rumex

* Surface de compensation écologique, selon OPD


Très large spectre d'efficacité

Picobello est efficace sur une multitude d'adventices dicotylédones dans les prairies et pâturages. Les adventices suivantes sont sensibles à Picobello: berce, rumex, ortie, chardons, renoncules, tussilage, trèfles, dent de lion, divers arbustes, plantains, épilobes et beaucoup d'autres.

Les graminées ne sont pas touchées par Picobello.

Picobello - Excellent niveau d'efficacité

Résultats de deux essais d'efficacité contre les orties et les ronces:



Avantages décisifs

- Excellente efficacité contre orties, chardons et ronces
- Bonne à très bonne efficacité contre rumex
- Agit de manière rapide et durable
- Répartition systémique des matières actives
- Épargne les graminées

Conseils d'utilisation

Appliquer Picobello en **traitement plante par plante** avec un pulvérisateur dorsal. Les plantes doivent être bien mouillées sur toute leur surface foliaire afin de garantir une absorption suffisante de matières actives. Au moment de l'application, les adventices doivent disposer de suffisamment de feuillage sain et jeune et se trouver dans une phase active de croissance.



Orties dioïques

0,3% (30 ml dans 10 l d'eau)

Appliquer au printemps ou en automne sur des plantes mesurant entre 20-30 cm.



Chardons

0,5% (50 ml dans 10 l d'eau)

Appliquer au printemps ou en automne sur des plantes mesurant entre 15-20 cm jusqu'à la formation des boutons floraux.



Ronces

0,5% (50 ml dans 10 l d'eau)

Appliquer après la récolte et jusqu'au début de l'hiver. Ne pas couper les ronces avant l'hiver qui suit.



Rumex

0,8-1% (80-100 ml dans 10 l d'eau)

Appliquer au printemps ou en automne sur des rumex au stade rosette.

Comment agit Picobello?

Les matières actives systémiques Triclopyr et Clopyralid sont principalement absorbées par les feuilles et sont réparties très rapidement à l'intérieur de la plante. En plus d'agir sur les parties vertes de la plante, Picobello permet une **destruction complète de son système racinaire**.



Marque enregistrée de Omya (Suisse) SA.
Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.