



# Systhane<sup>\*</sup> C-WG

*Le fongicide universel pour l'arboriculture*

Performant contre  
tavelure, oïdium,  
moniliose etc.

Application pour  
toutes les variétés  
de fruits

Action préventive  
et curative

# Systhane\* C-WG

POUR DES FRUITS SAINS

Systhane C-WG s'utilise dans les cultures de fruits à pépins, à noyau et petits fruits pour protéger efficacement les feuilles et les fruits contre les maladies fongiques. Grâce à une combinaison optimale des matières actives Myclobutanil et Captan, Systhane C-WG permet une lutte préventive et curative.



## Conseils d'utilisation

Fruits à pépins:	3 kg/ha tavelure oïdium monilioses
Fruits à noyau:	3 kg/ha maladie criblée oïdium monilioses
Coings:	3 kg/ha entomosporiose oïdium monilioses
Fraises:	2,5 kg/ha oïdium taches pourpres
Espèces de Ribes:	2,5 kg/ha oïdium rouille anthracnose



Dans une culture hautes tiges, le dosage lors d'une application au gun s'élève à 0,15%.

## Systhane C-WG - un fongicide arbo aux multiples avantages

- ★ Très large spectre d'efficacité  
Systhane C-WG assure une lutte performante contre toutes les principales maladies fongiques en arboriculture.
- ★ Action préventive et curative  
Assure une grande sécurité d'efficacité et permet un intervalle entre les applications de 10 à 14 jours.
- ★ Vaste homologation en arboriculture  
Est homologué dans les pommes, poires, coings, cerises, pruneaux, prunes, abricots, pêches, fraises, cassis, groseilles.
- ★ Excellente sélectivité pour toutes les variétés de fruits  
Les cultures intensives et les vergers hautes tiges composés de plusieurs variétés peuvent tous être traités avec la même bouillie de traitement.
- ★ Ne provoque pas de roussissure  
Des pulvérisations pendant et après la floraison ne présentent pas de problème.
- ★ Formulation granulée sans poussière  
L'utilisateur reste protégé des émissions de poussières toxiques. L'appareil de traitement est rempli plus facilement et plus rapidement en comparaison à une formulation poudrée.

## Fongicides dans les fruits à pépins

	Vitigran 35	2 kg/ha
Débourrement		
	Captan WDG + Elosal Supra	3 kg/ha 4 kg/ha
Pré-floraison		
	Espiro Plus + Elosal Supra	1,2 l/ha 4 kg/ha
Pré-floraison		
	Espiro Plus + Phaltan 80 WDG + Elosal Supra	1,2 l/ha 1 kg/ha 3 kg/ha
Floraison		
	Systhane C-WG + Elosal Supra	3 kg/ha 3 kg/ha
Post-floraison		
	Systhane C-WG	3 kg/ha
Post-floraison		
	Corsil + Captan WDG	0,2 kg/ha 3 kg/ha
Post-floraison		
	Systhane C-WG	3 kg/ha
Post-floraison		
	Corsil + Captan WDG	0,2 kg/ha 3 kg/ha
Post-floraison		
	Systhane C-WG	3 kg/ha
Eté		
	Captan WDG ou Phaltan WDG + Break-Thru	3 kg/ha 2 kg/ha 0,1-0,2 l/ha
Traitement de couverture		

**Remarques:**  
Variété Braeburn: ne pas traiter Captan WDG après la floraison.  
Poirier: ne pas employer Phaltan WDG.



**Omya (Schweiz) AG**  
AGRO  
CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41  
www.omya-agro.ch