

Funguran® Flow

*Le seul cuivre autorisé dans les betteraves



PLUS PUISSANT CONTRE LA CERCOSPORIOSE

Efficacité renforcée

Très facile d'emploi

Améliore rendement et qualité

EFFICACITÉ RENFORCÉE CONTRE LA CERCOSPORIOSE

Une pièce maîtresse dans la lutte contre la cercosporiose dans les betteraves. **Funguran Flow** augmente considérablement l'efficacité des fongicides systémiques. La formulation facile d'emploi et la puissante efficacité de **Funguran Flow** en font le seul produit cuprique homologué dans les betteraves

FUNGURAN FLOW EN UN COUP D'OEIL

- Facile d'emploi, formulation liquide
- Grande sécurité d'efficacité
- Protection plus rapide et durable
- Bonne résistance au lessivage
- Dosage facile et sans poussière
- Optimise la gestion des résistances
- Renforce l'efficacité des fongicides systémiques

Funguran Flow	Cuivre liquide
Matière active	Cuivre (sous forme d'hydroxyde) 300 g/l
Formulation	SC Suspension concentrée
Dosage	2-3 l/ha par split, en mélange avec un fongicide systémique comme Allegro.
Conditions	4 kg de cuivre métallique au maximum par hectare et par année. Le feuillage des betteraves traitées ne doit pas être utilisé pour l'affouragement. Délai d'attente: 2 semaines

RECOMMANDATION D'EMPLOI



FUNGURAN FLOW 2-3 l/ha + **Allegro** 0,75 l/ha




Une forte pression de cercosporiose peut engendrer jusqu'à 30% de perte en sucre.

Avec **FUNGURAN FLOW**, les producteurs de betteraves ont à leur disposition l'unique cuivre actuellement homologué afin de renforcer l'efficacité des fongicides systémiques contre la cercosporiose.

CONSEILS CONTRE LA CERCOSPORIOSE

- Le premier traitement doit avoir lieu immédiatement après l'apparition des premières tâches. Adapter les intervalles de traitement en fonction de la météo.
- Utiliser **FUNGURAN FLOW** à 2-3 l/ha par split, en mélange avec un fongicide systémique comme Allegro.
- **Allegro** est un excellent fongicide systémique. **Allegro** garde les feuilles juvéniles et permet une performance d'assimilation maximale (max. 2 appl./culture).
- L'utilisation du dosage maximal des fongicides systémiques est un facteur clé pour une lutte performante contre la cercosporiose.
- Appliquer sur les feuilles en conditions poussantes, par moins de 25°C et un taux d'humidité élevé. Traiter tôt le matin lors de journées chaudes. Une fine couche de rosée a un effet positif.
- Nous recommandons un volume de bouillie de 400 l/ha ainsi que l'utilisation de buses à double jet plat pour un mouillage optimal.

ESSAIS 2017 CONTRE LA CERCOSPORIOSE DANS LES BETTERAVES PAR FORTE PRESSION DE MALADIE



Résumé de 5 essais contre la cercosporiose dans les betteraves sur différents sites en Suisse romande.

Deux applications ont été réalisées contre la cercosporiose:

La 1^{ère} application a eu lieu fin juillet, la 2^{ème}, 3 semaines après. L'évaluation des symptômes a été effectuée 3 semaines après la 2^{ème} application.

Pression extrême de cercosporiose dans les témoins: Plus de 34% de la surface des feuilles infectées en moyenne (échelle selon standards EPP0).



Marque enregistrée de Spiess Urania Chemicals GmbH. Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.