

	Produkte	Dosierung /ha	Warte- frist	Wichtige Hinweise
--	----------	---------------	-----------------	-------------------

## KLEEGRAS-NEUANLAGEN

Blacken	<b>MCPB Omya</b>	5l	3 Wochen	Bei mildem, wüchsigem Wetter spritzen, wenn der Klee drei echte Blätter aufweist.
Blacken und Hirtentäschel	<b>MCPB Omya + MCPA Plus Omya</b>	2,5l 2l	3 Wochen	Gute Wirkung bis zum 2–4-Blatt-Stadium der Blacken.
Grössere Blacken	<b>MCPB Omya + Ruman</b>	4l 1l	3 Wochen	Wirkt auch gegen grössere Blacken. Spritzen, wenn der Klee vier echte Blätter hat. Spritzung muss nach ca. einer Woche wiederholt werden.
Blacken und verschiedene einjährige Samenunkräuter	<b>MCPB Omya + Kusak SG</b>	2l 0,8 kg	3 Wochen	Für alle Behandlungen in Klee gras-Neuanlagen gilt: Luzerne, Perser-, Alexandriner und Inkarnatklee nicht behandeln.

## WIESEN UND WEIDEN

Blacken	<b>Ruman</b>	4l	3 Wochen	Flächenbehandlung im Frühjahr auf gut entwickelte Blacken vor der Blütenstängelbildung.
	<b>Hoestar</b>	80 g		Flächenbehandlung im Spätsommer oder Herbst auf Blacken im Rosettenstadium.
	<b>Simplex</b>	0,5%		Einzelpflanzenbehandlung. Anwendung im Frühjahr oder Sommer bis Ende August auf Blacken im Rosettenstadium.
Grosse Brennnesseln	<b>Picobello</b>	0,3%	3 Wochen	Einzelpflanzenbehandlung. Behandlung im Frühjahr oder Herbst bei einer Wuchshöhe von 20–30 cm.
Disteln	<b>Picobello</b>	0,5%	3 Wochen	Einzelpflanzenbehandlung. Behandlung im Frühjahr oder Herbst bei einer Wuchshöhe von 15–20 cm bis zur Blütenknospenbildung.
Brombeersträucher	<b>Picobello</b>	0,5%	3 Wochen	Einzelpflanzenbehandlung. Behandlung nach der Erntezeit bis zum Winter einbruch.
Adlerfarn, Wurmfarne, Alpen-Blacken	<b>Ruman</b>	6–8l	3 Wochen	Behandlung im Frühjahr oder Herbst.
Weisser Germer, giftige Kreuzkräuter	<b>Plüsstar</b>	0,5–1%	3 Wochen	Einzelstockbehandlung.
Stickstoff-Düngung	<b>Entec 26</b>	3–4 kg/a		<b>Entec</b> zu Vegetationsbeginn oder nach dem ersten Schnitt streuen.

## KLEE ZUR SAATGUTPRODUKTION

Kleespitzmäuschen	<b>Audienz</b>	0,2l	3 Wochen	Maximal eine Behandlung pro Jahr.
-------------------	----------------	------	----------	-----------------------------------

## NICHTKULTURLAND

Brennnessel, Disteln, Brombeersträucher	<b>Picobello</b>	0,3–0,5%		Einzelpflanzenbehandlung an Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen.
Giftige Kreuzkräuter	<b>Plüsstar</b>	0,5–1%		

## ZIER- UND SPORTRASEN

Unkräuter inklusive Weissklee, mit guter Teilwirkung gegen Ehrenpreis-Arten, Gundelrebe, Kriechender Günsel	<b>Banvel M</b>	4l		Aufgelaufene Unkräuter behandeln. Bei mildem und wüchsigem Wetter spritzen.
	<b>Plüsstar</b>	1,5–2l		
Hirsens	<b>Puma extra</b>	0,4–1l		<b>Puma extra</b> auf aufgelaufene Hirsens spritzen. Nach der Behandlung Rasen 7–10 Tage nicht mähen. Agrostis-Rasen nicht behandeln, keine Anwendung im Hausgarten.
Diverse Pilzkrankheiten	<b>Amistar</b>	1l		Maximal 3 Anwendungen.
Pathogene Bodenpilze	<b>Policar 75 WG</b>	0,2–0,3%		Anwendung bei Befall, mit genügend Wasser auf den Boden giessen.