

	Produkte	Dosierung /ha	Warte-frist	Wichtige Hinweise
--	----------	---------------	-------------	-------------------

KLEEGRAS-NEUANLAGEN

Blacken	MCPB Omya	5l	3 Wochen	Bei mildem, wüchsigem Wetter spritzen, wenn der Klee drei echte Blätter aufweist.
Blacken und Hirtentäschel	MCPB Omya + MCPA Plus	2,5l 2l	3 Wochen	Gute Wirkung bis zum 2–4-Blatt-Stadium der Blacken.
Grössere Blacken	MCPB Omya + Ruman	4l 1l	3 Wochen	Wirkt auch gegen grössere Blacken. Spritzen, wenn der Klee vier echte Blätter hat. Spritzung muss nach ca. einer Woche wiederholt werden.
Blacken und verschiedene einjährige Samenunkräuter	MCPB Omya + Kusak SG	2l 0,8 kg	3 Wochen	Für alle Behandlungen in Klee-gras-Neuanlagen gilt: Luzerne, Perser-, Alexandriner- und Inkarnatklee nicht behandeln.

WIESEN UND WEIDEN

Blacken	Ruman	4l	3 Wochen	Flächenbehandlung im Frühjahr auf gut entwickelte Blacken vor der Blütenstängelbildung.
	Hoestar	80 g		Flächenbehandlung im Spätsommer oder Herbst auf Blacken im Rosettenstadium.
	Simplex	0,5%		Einzelpflanzenbehandlung. Anwendung im Frühjahr oder Sommer bis Ende August auf Blacken im Rosettenstadium. NEU Anwendung via detektionsbasierter, selektiver Applikationsgeräte (z.B. Ecorobotix, etc.).
Grosse Brennnesseln	Picobello	0,3%	3 Wochen	Einzelpflanzenbehandlung. Behandlung im Frühjahr oder Herbst bei einer Wuchshöhe von 20–30 cm. Detektionsbasierte, selektive Applikation möglich.
Disteln	Picobello	0,5%	3 Wochen	Einzelpflanzenbehandlung. Behandlung im Frühjahr oder Herbst bei einer Wuchshöhe von 15–20 cm bis zur Blütenknospenbildung. Detektionsbasierte, selektive Applikation möglich.
Brombeersträucher	Picobello	0,5%	3 Wochen	Einzelpflanzenbehandlung. Behandlung nach der Erntezeit bis zum Wintereinbruch. Detektionsbasierte, selektive Applikation möglich.
Adlerfarn, Wurm-farn, Alpen-Blacken	Ruman	6–8l	3 Wochen	Behandlung im Frühjahr oder Herbst.
Weisser Germer, Disteln, TW: Blacken	Plüsstar	1,5–2,5l		Flächenbehandlung. Anwendung vor der Neuansaat bei wüchsiger Witterung.
Stickstoff-Düngung	NovaTec 26	3–4 kg/a		NovaTec 26 zu Vegetationsbeginn oder nach dem ersten Schnitt streuen.

KLEE ZUR SAATGUTPRODUKTION

Kleespitzmäuschen	Audienz	0,2l	3 Wochen	Maximal eine Behandlung pro Jahr.
-------------------	----------------	------	----------	-----------------------------------

NICHTKULTURLAND

Brennnessel, Disteln, Brombeersträucher	Picobello	0,3–0,5%		Einzelpflanzenbehandlung an Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen.
Blacken, Giftige Kreuzkräuter, Japanknöterich	Simplex	0,5–1%		Einzelpflanzenbehandlung an Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen.

ZIER- UND SPORTRASEN

Unkräuter inklusive Weissklee, mit guter Teilwirkung gegen Ehrenpreis-Arten, Gundelrebe, Kriechender Günsel	Banvel M	4l		Aufgelaufene Unkräuter behandeln. Bei mildem und wüchsigem Wetter spritzen.
	Plüsstar	1,5–2l		
Hirschen	Puma extra	0,4–1l		Puma extra auf aufgelaufene Hirschen spritzen. Nach der Behandlung Rasen 7–10 Tage nicht mähen. Agrostis-Rasen nicht behandeln, keine Anwendung im Hausgarten.
Diverse Pilzkrankheiten	Amistar	1l		Maximal 3 Anwendungen.

NEU: RATRON STICKS GEGEN WÜHLMÄUSE IM GRÜNLAND

Die neuen **Ratron Sticks** sind gebrauchsfertige Ködersticks zur nachhaltigen Bekämpfung von Wühlmäusen (*Arvicola terrestris*) im Grünland. Sie bestehen aus hochwertigen, pflanzlichen Köderstoffen und enthalten den neuen Wirkstoff Zinkphosphid. Bereits geringste Mengen sind für die Wühlmäuse letal.

Anwendung: Die gebrauchsfertigen **Ratron Sticks** einfach im Abstand von 3–5 m in die Wühlmausgänge legen.

