

STEINOBST

KIRSCHEN

Stadium	Schaderreger	Produkte	Dosierung (l, kg/ha)		Wichtige Hinweise
Herbst / Winter	Frostrisse	DS 60 spezial			Anwendung im Spätherbst, vor den ersten Frösten.
 Austrieb	Schrotschuss, Bakterienbrand	Vitigran 35 oder Funguran Flow	0,43% 0,3–0,45%	6,9 kg 4,8–7,2 l	Austriebsspritzung im Stadium B, max. 4 kg Kupfer-Metall pro ha und Jahr im Steinobst.
	Frostspanner, Gallmilben, Napfschildläuse, Rote Spinne, etc.	Weissöl Omya	3,5%	56 l	3,5% nur beim Knospenschwellen. 2% (32 l/ha) gegen Rote Spinne beim Erscheinen der Blütenknospen, 1% (16 l/ha) beim Öffnen der Kelchblätter.
 Vorblüte	Schrotschuss	Elosal Supra + Captan WDG	0,25% 0,15%	4–5 kg 2,4 kg	Kurz vor der Blüte. Basisbrühmenge bis und mit Aufblühen der Kirschen: 1600 l/ha.
	Frostspanner, Schalenwickler	Audienz	0,02%	0,32 l	Audienz und DiPel DF sind mischbar mit Elosal Supra + Captan WDG .
	Frostspanner, Gespinstmotte	DiPel DF	0,05%	0,8 kg	DiPel DF wirkt nur bei Temperaturen > 12 °C. Bekämpfung von Schalenwickler und Frostspanner unmittelbar vor oder nach der Blüte.
	Schalenwickler	DiPel DF	0,1%	1,6 kg	Stärkung der Blütenknospen. Mischbar mit Elosal Supra + Captan und den Insektiziden.
		Algan	0,125%	2 l	
 Beginn Blüte Vollblüte	Monilia, Schrotschuss	Lumino + Captan WDG	0,02% 0,1%	0,32 l 1,6 kg	Erste Moniliabehandlung, wenn 10–20% offene Blüten vorhanden. Fungizidbehandlungen während der Blüte alle 4–5 Tage mit erhöhter Wassermenge spritzen. Basisbrühmenge während und nach der Blüte: 2000 l/ha (Baumvolumen: 15 000 m³/ha).
		+ Maneltra Bor Plus	0,1%	2 l	
		+ Algan	0,1%	2 l	
	Monilia, Schrotschuss	Prolectus + Captan WDG	0,075% 0,15%	1,2 kg 3 kg	Anstelle von Lumino + Captan WDG kann bis Ende Blüte auch Amistar eingesetzt werden.
		+ Azolon fluid	0,2%	4 l	
	Ende Blüte	Lumino + Captan WDG	0,02% 0,1%	0,32 l 1,6 kg	Maneltra Bor Plus während der Blüte fördert die Befruchtung.
		+ Azolon fluid	0,2%	4 l	
		+ Maneltra Bor Plus	0,1%	2 l	
 Schorniggelstadium	Monilia, Schrotschuss, Sprühflecken	Lumino + Captan WDG + Elosal Supra	0,02% 0,1% 0,25%	0,32 l 1,6 kg 1–5 kg	Lumino ist ein SSH-Produkt; max. 4 Behandlungen mit SSH-Produkten pro Jahr.
		Azolon fluid	0,2%	4 l	
		Complestal Microplant	0,05%	1 l	
	Blattläuse	Pirimicarb oder Teppeki	0,04% 0,01%	0,8 kg 0,16 kg	Azolon fluid und Microplant stärken die Fruchtentwicklung und können zusammen mit den Fungiziden angewendet werden.
 Fruchtentwicklung	Bitterfäule, Schrotschuss, Sprühflecken	Captan WDG oder Phaltan 80 WDG	0,15% 0,125%	3 kg 2,5 kg	Wartefrist: 3 Wochen.
	Vorbeugen bei Platzdruck	+ Complestal Aminocal	0,15%	3 l	Unmittelbar vor dem Regen behandeln.
	Kirschenfliege	Pistol	0,02%	0,32 kg	2 Behandlungen im Abstand von 10 Tagen. 1. Behandlung kurz vor dem Farbumschlag. Wartefrist 2 Wochen.
	Monilia, Bitterfäule, Schrotschuss, Sprühflecken	Prolectus + Delan WG	0,075% 0,05%	1,2 kg 1 kg	1. Abschlussbehandlung. Wartefrist: 3 Wochen. Max. 3 Behandlungen mit Prolectus pro Jahr.
		+ Trapper Amin	0,2%	3 l	
Vor der Ernte	Monilia	Prolectus + Break-Thru	0,075% 0,01%	1,2 kg 0,2 l	2. Abschlussbehandlung. Wartefrist: 3 Wochen, bei Anlagen ohne Regenabdeckung 10 Tage.
	Kirschessigfliege	Audienz	0,02%	0,32 l	Wartefrist 7 Tage. Max. 2 Behandlungen.
Nacherntebehandlung	Sprühflecken, Stärkung der Blütenknospen	Phaltan 80 WDG	0,125%	2,5 kg	Azolon fluid fördert die Blütenknospenbildung.
		+ Azolon fluid	0,25%	5 l	
Blattfall	Bakterienbrand	Funguran Flow	0,3%	6 l	1–2 Behandlungen beim Blattfall, max. 4 kg Reinkupfer pro ha und Jahr im Steinobst.
	Abbrennen von Stockausschlägen	Firebird Plus	0,5%		Mit 300–500 l/ha Wasser ab dem 3. Standjahr. Max. 2 × pro Parzelle und Jahr. Abdrift vermeiden.
	Ungräser	Ruga		2,5–6 l	Ab erstem Standjahr.

ZWETSCHGEN / PFLAUMEN

Stadium	Schaderreger	Produkte	Dosierung (l, kg/ha)		Wichtige Hinweise
Herbst / Winter	Frostrisse	DS 60 spezial			Anwendung im Spätherbst, vor den ersten Frösten.
Austrieb 	Schrotschuss, Narren- oder Taschenkrankheit, Kräuselkrankheit	Vitigran 35 oder Funguran Flow	0,43% 0,3–0,45%	6,9 kg 4,8–7,2 l	Beim Austrieb vor Aufbrechen der Knospen, max. 4 kg Kupfer-Metall pro ha und Jahr im Steinobst.
	Frostspanner, Gallmilben, Napfschildläuse, Rote Spinne, etc.	Weissöl Omya	3,5%	56 l	3,5% nur beim Knospenschwellen. 2% (32 l/ha) gegen Rote Spinne beim Erscheinen der Blütenknospen, 1% (16 l/ha) beim Öffnen der Kelchblätter.
Aufblühen 	Monilia, Schrotschuss	Lumino + Captan WDG + Elosal Supra	0,02% 0,1% 0,25%	0,32 l 1,6 kg 4 kg	1. Monilia-Behandlung in die aufgehende Blüte. Basisbrühmenge bis und mit Aufblühen der Zwetschgen: 1600 l/ha.
	Bor-Mangel	Maneltra Bor Plus		2 l	1. Bor-Behandlung, wenn Knospen entwickelt sind.
		Algan		2 l	Stärkung der Blütenknospen. Mischbar mit Elosal Supra + Captan und den Insektiziden.
	Frostspanner, Schalenwickler	Audienz	0,02%	0,32 l	Audienz und DiPel DF sind mischbar mit Elosal Supra + Captan WDG . Bekämpfung von Schalenwickler und Frostspanner unmittelbar vor oder nach der Blüte.
	Frostspanner, Gespinnstmotte	DiPel DF	0,05%	0,8 kg	DiPel DF wirkt nur bei Temperaturen > 12 °C. Rostmilben können mit 3–4 Spritzungen ab Blühbeginn bis Ende Mai mit Elosal Supra (3–4 kg/ha) kontrolliert werden.
	Schalenwickler	DiPel DF	0,1%	1,6 kg	
	Grüne Zwetschgenblattlaus	Pirimicarb	0,04%	0,64 kg	Eine Vorblütenspritzung bei Befall.
Blüte 	Monilia, Schrotschuss	Prolectus + Captan WDG	0,075% 0,15%	1,2 kg 3 kg	2. Moniliabehandlung in die volle bis abgehende Blüte. Prolectus: max. 3 Behandlungen pro Parzelle / Jahr (Blüten- und Vorerntebehandlungen). Basisbrühmenge während und nach der Blüte: 2000 l/ha (Baumvolumen: 15 000 m³/ha).
Nachblüte / Fruchtentwicklung 	Monilia, Schrotschuss	Lumino + Captan WDG + Elosal Supra	0,02% 0,1% 0,25%	0,32 l 1,6 kg 4 kg	1. Nachblütenspritzung unmittelbar nach dem Abblühen. Lumino: max. 4 Behandlungen pro Parzelle / Jahr.
	Bor-Mangel	Maneltra Bor Plus		2 l	2. Bor-Behandlung mit Maneltra Bor Plus und Complezal Aminocal zur Behangsregulierung und Verbesserung der Fruchtqualität, beim Abfallen der Blütenblätter. Mischbar mit Fungiziden.
	Vorbeugen bei Platzdruck	Complezal Aminocal		5 l	
	Sägewespen, Blattläuse	Pistol	0,015%	0,24 kg	Anwendung gegen Sägewespen unmittelbar nach der Blüte. Max. 2 Anwendungen pro Parzelle / Jahr.
	Blattläuse	Pirimicarb	0,04%	0,8 kg	Insektizide können nach der Blüte zusammen mit Fungiziden und Flüssigdüngern gespritzt werden.
		Teppeki	0,01%	0,16 kg	Max. 2 Behandlungen / Jahr im Abstand von 3 Wochen.
	Spinn- und Rostmilben	Kiron	0,1%	2 l	Mit 800–1000 l/ha Wasser spritzen. Wartefrist: 3 Wochen.
	Fruchtmonilia, Schrotschuss, Zwetschgenrost	Prolectus + Delan WG	0,075% 0,05%	1,2 kg 1 kg	1. Abschlussbehandlung. Wartefrist: 3 Wochen.
	Fruchtmonilia	Prolectus + Break-Thru	0,075% 0,01%	1,2 kg 0,2 l	2. Abschlussbehandlung. Wartefrist: 3 Wochen, bei Anlagen ohne Regenabdeckung 10 Tage.
	Abbrennen von Stockausschlägen	Firebird Plus	0,5%		Mit 300–500 l/ha Wasser ab dem 3. Standjahr. Max. 2 × pro Parzelle und Jahr.
	Ungräser	Ruga		2,5–6 l	Ab erstem Standjahr.

BEKÄMPFUNG DER KIRSCHESIGFLIEGE (KEF) IM STEINOBST:

Pistol: Kirschen, Aprikosen, Pflaumen / Zwetschgen, Pfirsich / Nektarine: 0,02% (0,32 kg/ha). Max. 2 Behandlungen.
Wartefrist in Kirschen 7 Tage, Wartefrist in anderen Kulturen 14 Tage.

Audienz: Aprikosen, Pflaumen / Zwetschgen, Pfirsich / Nektarine: 0,02% (0,32 l/ha). Max. 2 Behandlungen. Wartefrist 7 Tage.

Die Allgemeinverfügung für Audienz und Pistol für die Saison 2025 wird erwartet.