

				
Débourrement	Boutons floraux visibles	Floraison	Formation des fruits	Après la récolte/nouvelle plantation

DÉSHERBAGE

Graminées et dicotylédones annuelles	Nikkel 2,5l/ha			Mentor Uno 1,5-3l/ha	En automne, 2 traitements avec Mentor Uno , 1 ^{ère} application 14 jours après la plantation au stade cotylédons des adventices. Répéter l'application 8-10 jours après. Appliquer Bredola en septembre, après l'enracinement de la culture. Si nécessaire, Nikkel peut être appliqué au printemps au débourrement.
			Respecter les restrictions PER.	Bredola 1,5-2l/ha	
				Nikkel 2,5-3l/ha	
Dicotylédones annuelles	Alopex 167 g/ha			Alopex 167 g/ha	Max. 1 application au printemps avant la floraison ou en été après la récolte.
Graminées	Ruga 2-6l/ha			Ruga 2-6l/ha	2,5-3l/ha contre les graminées annuelles, 4-6l/ha contre les graminées vivaces. Délai d'att: 6 sem.

MALADIES

Oïdium	Taifen 0,6l/ha			Taifen 0,6l/ha	Taifen : max. 3 applications par année avec difénoconazole ou avec des fongicides du groupe des SDHI. Délai d'attente: 1 jour.
	Corsil 0,3 kg/ha			Corsil 0,3 kg/ha	Corsil et Amistar contiennent des strobilurines. Max 3 traitements par parcelle et par année avec des strobilurines. Délai d'attente: 3 semaines.
	Amistar 1l/ha			Amistar 1l/ha	
	Elosal Supra 2-4 kg/ha			Elosal Supra 2-4 kg/ha	Délai d'attente: 3 jours. Utilisation par temps couvert. Ne pas utiliser par temps chaud.
	Heliosoufre S 2-4l/ha			Heliosoufre S 2-4l/ha	
	Funga 3-5 kg/ha			Funga 3-5 kg/ha	Délai d'attente: 1 jour. Ne pas utiliser en cas de sécheresse.
Taches de feuilles	Funguran Flow 1,5-2l/ha			Funguran Flow 1,5-2l/ha	Max. 4 kg de cuivre métal par ha et par année.
Botrytis, pourriture grise		Espiro 2,5l/ha			Une application de Espiro pendant la pleine floraison. Délai d'attente: 2 semaines.
		Prolectus 1,2 kg/ha			Max. 2 traitements avec Prolectus . Délai d'attente: 3 jours.

RAVAGEURS

Acariens	Milbeknock 1,25l/ha			Milbeknock 1,25l/ha	Milbeknock agit contre tous les stades mobiles. Délai d'attente: 1 sem. 1 application par année.
		Majestik 25l/ha			Majestik : délai d'attente: 3 jours.
Acarien jaune, tarsonème du fraisier	Kiron 2l/ha			Kiron 2l/ha	Kiron agit contre tous les stades mobiles. Délai d'attente: 3 sem., max. 1 application par année.
Acariens, pucerons	Siva 50 20l/ha			Siva 50 20l/ha	Bien mouiller les plantes, efficacité seulement par contact direct. Délai d'attente: 1 semaine.
Thrips, anthonome du fraisier	Audienz 0,2l/ha			Audienz 0,2l/ha	Délai d'attente: 3 jours, max. 2 applications par an.
Drosophila suzukii		Audienz 0,2l/ha			Application à la maturation des fruits. Max. 2 applications. Délai d'attente: 3 jours.
Limaces	Steiner Gold 5 kg/ha				Ne pas saupoudrer les parties comestibles des plantes. Max. 700 g de métaldéhyde par ha et par année sur la même parcelle.