

PRAIRIES ET PÂTURAGES, GAZONS

	Produits	Dosages /ha	Délai d'att.	Remarques
--	----------	-------------	--------------	-----------

SEMIS MÉLANGES FOURRAGERS (TRÈFLES / GRAMINÉES)

Rumex	MCPB Omya	5l	3 sem	Traiter par temps doux et poussant, lorsque le trèfle a atteint 3 vraies feuilles.
Rumex et capselle bourse-à-pasteur	MCPB Omya + MCPA Plus	2,5l 2l	3 sem	Très bonne efficacité jusqu'au stade 2-4-feuilles des rumex.
Rumex plus développés	MCPB Omya + Ruman	4l 1l	3 sem	Agit aussi contre les rumex plus développés. Traiter dès que le trèfle a atteint 4 vraies feuilles. Répéter l'application après environ 1 sem.
Rumex et diverses dicotylédones annuelles	MCPB Omya + Kusak SG	2l 0,8 kg	3 sem	Pour toutes les applications sur des nouveaux semis de trèfles/graminées: ne pas traiter la luzerne, le trèfle de Perse, le trèfle d'Alexandrie et le trèfle d'incarnat.

PRAIRIES ET PÂTURAGES

Rumex	Ruman	4l	3 sem	Au printemps sur toute la surface sur des rumex bien développés, avant la formation des fleurs.
	Hoestar	80g		En fin d'été ou en automne sur toute la surface sur des rumex au stade rosette.
	Simplex	0,5%		Traitement plante par plante. Au printemps ou en été jusqu'à la fin août sur des rumex au stade rosette.  Application via des dispositifs d'application sélective basés sur la détection (par ex. Ecorobotix, etc.).
Orties dioïques	Picobello	0,3%	3 sem	Traitement plante par plante. Au printemps ou en automne sur des plantes mesurant 20-30 cm. Application sélective basée sur la détection possible.
Chardons	Picobello	0,5%	3 sem	Traitement plante par plante. Au printemps ou en automne sur des plantes mesurant 15-20 cm jusqu'à la formation des fleurs. Application sélective basée sur la détection possible.
Ronces	Picobello	0,5%	3 sem	Traitement plante par plante, après la récolte jusqu'au début de l'hiver. Application sélective basée sur la détection possible.
Fougère impériale, dryoptéris, rumex	Ruman	6-8l	3 sem	Application au printemps et en automne.
Vératres blancs, chardons Effet partiel: rumex	Plüsstar	1,5-2,5l		Traitement de surface. Application avant le semis en cas de conditions favorables à la croissance.
Fumure azotée	NovaTec 26	3-4 kg/a		Épandre NovaTec 26 à la début de végétation ou après la 1 ^{ère} coupe.

TRÈFLES POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES

Apions du trèfle	Audienz	0,2l	3 sem	Max. une application par année.
------------------	----------------	------	-------	---------------------------------

ZONES NON CULTIVÉES

Chardons, orties dioïques, ronces	Picobello	0,3-0,5%		Traitement plante par plante sur les talus et bandes vertes le long des voies de communication.
Rumex, séneçons toxiques, renouée du Japon	Simplex	0,5-1%		Traitement plante par plante sur les talus et bandes vertes le long des voies de communication.

GAZONS DE SPORT ET D'ORNEMENT

Dicotylédones, trèfles blancs inclus, avec un bon effet partiel contre véroniques, lierres terrestres, bugles rampants	Banvel M	4l		Appliquer sur des mauvaises herbes levées. Traiter par temps doux et poussant.
	Plüsstar	1,5-2l		
Millets	Puma extra	0,4-1l		Appliquer Puma extra sur des millets levés. Ne pas tondre le gazon durant les 7-10 jours suivant l'application. Ne pas appliquer sur gazons composés d'agrostides et dans les jardins familiaux.
Diverses maladies fongiques	Amistar	1l		Max. 3 applications.

NOUVEAUX: RATRON STICKS CONTRE LES CAMPAGNOLS TERRESTRES

NOUVEAU

Les nouveaux **Ratron Sticks** sont des appâts en bâtonnets prêts à l'emploi pour lutter efficacement et durablement contre les campagnols (*Arvicola terrestris*) dans les prairies. Ils sont composés d'appâts végétaux de haute qualité, contenant la nouvelle substance active phosphore de zinc. Même des quantités infimes ont un effet léthal sur les campagnols. **Application:** Il suffit de placer les **Ratron Sticks** prêts à l'emploi dans les galeries des campagnols, à intervalles de 3 à 5 m.