

Technische Informationen

MCPA Plus Omya

Herbizid zur Bekämpfung von ein- und mehrjährigen Unkräutern im Getreide, in Wiesen und Weiden, in Zier- und Sportrasen und auf Brachland.

Wirkstoff: 500 g/l MCPA

Formulierung: Wasserlösliches Konzentrat

ANWENDUNG:

GETREIDE:

Aufwandmenge: 3,0 l/ha

Behandlung im Frühjahr, Stadium 13-31 (BBCH) bei warmem, wüchsigem Wetter.

MCPA Plus Omya wirkt in einem frühen Einsatz sehr gut gegen Ausfallraps, Kornblume und Gänsefuss. Wirkungsvolle Spätbehandlungen gegen Disteln, Winden, Storchschnabel und Kornblumen sind mit reduzierter Aufwandmenge (1,5 l/ha) bis BBCH 39 möglich.

Bekämpfung ALS-Hemmer resistente Durchwuchs-Zuckerrüben (Smart-Sorten): Möglichkeit bei genügend Blattmasse der Rüben mit der Kombination aus MCPA Plus Omya 3 l/ha + Starane XL 1,8 l/ha oder MCPA Plus Omya 3 l/ha + Pixxaro EC 0,5 l/ha.

WIESEN UND WEIDEN:

Aufwandmenge: 3,0 l/ha

Zur Flächenbehandlung nach Neuansaat gegen ein- und mehrjährige Unkräuter (inkl. Hahnenfuss-Arten), nach dem Auflaufen der Neuansaat.

Aufwandmenge: 0,75 %

Zur Einzelpflanzenbehandlung gegen mehrjährige Disteln und Blacken (Rumex-Arten).

Wartefrist für Wiesen und Weiden: 3 Wochen. Beweidung oder Schnitt (Grünfutter oder Konservierung) frühestens 3 Wochen nach der Behandlung.

ZIER- UND SPORTRASEN:

Aufwandmenge: 3,0 l/ha

Gegen einjährige Unkräuter, während der Vegetationsperiode (Mai-August). Maximal 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr im Abstand von 28 Tagen.

BRACHLAND:

Aufwandmenge: 0,75 %

Zur Einzelpflanzenbehandlung gegen Ackerkratzdisteln.

ANWENDERSCHUTZ-AUFLAGE:

Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille oder Visier tragen.

WIRKUNGSSPEKTRUM:

Folgende Unkräuter werden gut bekämpft:

Ackersenf	Hirtentäschel
Amarant-Arten	Kratzdistel, Acker-
Franzosenkraut	Melde, Gemeine
Gänsefuss, Weisses	Wegerich-Arten
Hahnenfuss	Winden
Hellerkraut	Klatschmohn

Eine Teilwirkung wird erzielt gegen:

Ausfallraps	Nachtschatten
Bingelkraut	Taubnessel
Blacken	Vergissmeinnicht
Hederich	Wicken
Hohlzahn	Schachtelhalm
	Vogelmiere

MISCHBARKEIT:

MCPA Plus Omya ist gut mischbar mit **BiPlay SX**, **Starane XL**, **Pixxaro EC**, **Sprinter**, **MCPB Omya**



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

sowie **Cycocel extra**. Auch Mischungen mit **Ruman** in Wiesen und Weiden sind möglich.

MCPA Plus Omya nicht mit **Puma extra** sowie **Grant** mischen.

WIRKUNGSWEISE:

MCPA gehört zur Gruppe der Wuchsstoff-Herbizide. **MCPA** wird hauptsächlich über die Blätter aufgenommen und im Phloemsaftstrom in der Pflanze verteilt. Der Wuchsstoff verursacht ein übertriebenes Wachstum der Unkräuter, welches zu Blatt- und Stängeldeformationen und schliesslich zum Absterben der Unkräuter führt.

VERPACKUNG: **Flaschen à 5 l**
 Karton à 2 x 5 l
 Kannen à 10 l

GEFAHRENKENNZEICHNUNGEN:

Gefahrenbezeichnungen:

GHS05 Ätzend
GHS07 Vorsicht gefährlich
GHS09 Gewässergefährdend

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264 Nach Handhabung Hände gründlich waschen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtschutz tragen.
P301+P312+P330 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Mund ausspülen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhan-

dene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Spe 1 Zum Schutz von Bodenorganismen dieses Pflanzenschutzmittel nicht mehr als 4 mal pro Parzelle und Jahr anwenden.

Die Angaben der technischen Merkblätter dienen zur Information. Massgebend sind die Gebrauchsanweisungen auf unseren Packungen.