

Fiche technique

MAJESTIK®

Insecticide naturel à base de maltodextrine pour un emploi en arboriculture, cultures de baies, cultures maraîchères et cultures ornementales

Matière active: 598 g/l Maltodextrine (49%)

Formulation: Concentré soluble dans l'eau (SL)

EMPLOI:

ARBORICULTURE:

Poirier, pommier: 2,5% (40 l/ha)

Acariens tétranyques

Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume des arbres. Veillez à mouiller minutieusement toutes les parties des arbres afin d'obtenir une couverture uniforme et régulière. Le volume de bouillie de traitement doit être de 1'500 à 2'000 l/ha. La concentration maximale de **MAJESTIK** dans la bouillie de traitement est de 2,5%. Lors de traitements avec moins d'eau, le dosage correspondant doit être réduit en conséquence (par exemple 25 l de Majestik dans 1000 l d'eau par ha).

BAIES:

Fraises: 2,5% (25 l/ha)

Acariens tétranyques

Délai d'attente: 3 jours

Les plants de fraisiers doivent être minutieusement mouillés, également la surface inférieure des feuilles. Traiter **MAJESTIK** avec une quantité de bouillie de 1'000 l/ha.

Le dosage indiqué se réfère au stade "pleine floraison" et "début de la coloration rouge des fruits", 4 plants par m²; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au stade de la culture à traiter.

CULTURES MARAÎCHÈRES:

Aubergine, concombre, poivron doux, tomate: 2,5%

pucerons
acariens tétranyques
mouche blanche

Délai d'attente: 3 jours

Courgette, haricots: 2,5% (25 l/ha)

pucerons
acarien tétranyques
mouches blanches

Délai d'attente: 3 jours

Les cultures maraîchères doivent être minutieusement mouillées, également la surface inférieure du feuillage. La quantité de bouillie devrait être d'au moins 1'000 l/ha. Pour les cultures les plus volumineuses (aubergine, concombre, poivron, tomate) la quantité de bouillie doit être augmentée à 1'500 jusqu'à 2'000 l/ha.

PLANTES ORNEMENTALES:

Dosage: 2,5 %

Pucerons du feuillage
Acariens tétranyques

Emploi dans les cultures florales, plantes vertes, et rosiers. Effectuer 2 traitements avec un intervalle de 4-7 jours. Ne pas appliquer sur les fleurs. L'emploi de **MAJESTIK** s'effectue avec une quantité de bouillie de 1'000 à 2'000 l/ha en fonction de la taille de la culture.

REMARQUES GÉNÉRALES:

Les plantes doivent être uniformément et régulièrement mouillées sur toutes les parties, car **MAJESTIK** agit uniquement par contact. Veillez à bien mouiller la surface supérieure et la surface inférieure des feuilles afin d'atteindre avec la bouillie de traitement les insectes ravageurs cachés.



Omya (Schweiz) AG
AGRO

CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

Lors de températures journalières dépassant les 25°C, traiter **MAJESTIK** uniquement le soir.

Les meilleurs résultats d'efficacité avec **MAJESTIK** sont obtenus lors de conditions climatiques sèches. Après le traitement, il ne devrait pas pleuvoir pendant un jour afin que l'efficacité de **MAJESTIK** ne soit pas réduite.

Pour une efficacité optimale, il est parfois nécessaire de répéter l'application avec **MAJESTIK** après 4 à 7 jours.

MAJESTIK agit contre les nymphes et les adultes de pucerons et d'acariens, et contre les œufs, larves, chrysalides et les adultes de mouches blanches.

SÉLECTIVITÉ:

MAJESTIK montre une excellente sélectivité dans les différentes cultures. La concentration de 2,5 % ne devrait pas être dépassée.

En cultures ornementales, avant de traiter une grande surface, il est recommandé de tester la sélectivité sur quelques feuilles. Les fleurs ne devraient pas être traitées, car des dommages ont déjà été observés sur les pétales de cyclamen par exemple.

Des applications répétées de **MAJESTIK** sur les tomates peuvent conduire à un aspect poisseux des fruits. Ceci n'a été observé que dans les tomates.

CONDITIONS DE PROTECTION POUR L'UTILISATEUR:

Préparation de la bouillie: Porter des lunettes de protection ou une visière.

MISCIBILITÉ:

MAJESTIK est traité seul.

AUXILIAIRES:

MAJESTIK a également une efficacité de contact sur les auxiliaires. Lorsque la bouillie de traitement a séchée, les auxiliaires ne sont plus perturbés et un lâcher de nouveaux auxiliaires est à nouveau possible. **MAJESTIK** n'a pas d'efficacité sur les œufs de typhlodrones.

CONDITIONS GÉNÉRALES:

MAJESTIK est dangereux pour les abeilles. Pulvérisation uniquement le soir, en dehors de la période de vol des abeilles sur les plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies). Ne peut être employé dans des serres fermées, uniquement lorsque les pollinisateurs ne sont pas présents.

MODE D'ACTION

MAJESTIK est un insecticide biologique de contact avec la matière active maltodextrine. Une efficacité n'est obtenue que sur les insectes ravageurs atteints directement par la bouillie de traitement. C'est pourquoi une 2^{ème} application est souvent nécessaire pour une efficacité totale.

L'activité de **MAJESTIK** est purement physique. Lors d'un bon mouillage, les insectes ravageurs sont complètement recouvert par un film de maltodextrine. La maltodextrine sèche et bloque la respiration et conduit à l'asphyxie des insectes ravageurs. De plus la maltodextrine séchée provoque une paralysie des insectes ravageurs atteints par la bouillie de traitement.

L'efficacité est très rapidement visible après le traitement. Normalement l'efficacité maximale est déjà observée 2-4 heures après l'application.

Maltodextrine est une substance produite naturellement, par extraction lors de l'hydrolyse de l'amidon. Le produit est 100% biodégradable.

EMBALLAGE **bouteilles de 20 l**

DANGER-RISQUE-SÉCURITÉ:

Pictogramme:

GHS07 Attention dangereux

Mention d'avertissement: Attention

Mentions de danger:

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Mentions de prudence:

- P102 À conserver hors de portée des enfants.
P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Les renseignements mentionnés dans cette fiche technique ne sont que des données générales. Respecter scrupuleusement les informations figurant sur les étiquettes.

© Marque enregistrée de Certis Europe BLV