



# Picobello<sup>®</sup>

Stoppt Brennnesseln, Disteln, Blacken und Sträucher



## **NACHHALTIGE UNKRAUTBEKÄMPFUNG**

Schnell und dauerhaft  
Systemisch  
Gräserverträglich

# ERFOLGREICH GEGEN HARTNÄCKIGE PROBLEMUNKRÄUTER

Picobello ist ein selektives und blattaktives Herbizid gegen Problemunkräuter. Es bekämpft erfolgreich Brennnesseln, Disteln, Brombeersträucher und Blacken in Wiesen und Weiden, in Böschungen und Grünstreifen entlang der Strassen sowie in Ökoflächen.

## Profil

<b>Wirkstoff:</b>	240 g/l Triclopyr, 60 g/l Clopyralid
<b>Formulierung:</b>	Emulsionskonzentrat (EC)
<b>Nachbau:</b>	Einen Monat nach der Applikation können bei einem Umbruch der Wiese oder Weide (Pflug) Getreide, Mais und Grasmischungen angesät werden. Nach 6 Monaten ist die Aussaat von Zuckerrüben, Sonnenblumen, Raps und Leguminosen möglich.

## Anwendungen:

<b>Wiesen/Weiden:</b>	Brennnesseln, Brombeersträucher, Disteln, Blacken
<b>Böschungen und Grünstreifen, Brachland und Humusdeponien:</b>	Brennnesseln, Brombeersträucher, Disteln, Blacken (nur auf Brachland)
<b>Öko Grünflächen:</b>	Ackerkratzdistel, Brombeersträucher, Blacken
<b>Ökoackerflächen:</b>	Ackerkratzdistel, Blacken


## Sehr breites Wirkungsspektrum

Picobello erfasst eine Vielzahl von Unkräutern in Wiesen und Weiden. Bärenklau, Blacken, Brennnesseln, Disteln, Hahnenfuss-Arten, Huflattich, Klee-Arten, Löwenzahn, verschiedene Sträucher, Wegerich-Arten, Weideröschen und viele andere Pflanzen reagieren empfindlich auf Picobello.

**Gräser werden durch Picobello nicht geschädigt.**

## Picobello wirkt sicher und nachhaltig

Ergebnisse von je 2 Wirkungsversuchen gegen Brennnesseln und Brombeersträucher:



## Überzeugende Vorteile

- **Bärenstark gegen Brennnesseln, Disteln und Sträucher**
- **Gute bis sehr gute Wirkung gegen Blacken**
- **Wirkt schnell und dauerhaft**
- **Systemische Wirkstoffverteilung**
- **Schont die Gräser**

## Anwendungsempfehlungen

Die Unkrautbekämpfung mit Picobello erfolgt als **Einzelpflanzenbehandlung** mit der Rückenspritze. Die Pflanzen müssen ausreichend benetzt werden und genügend Blattmasse aufweisen, damit reichlich Wirkstoff aufgenommen wird. Ausserdem sollten sich die Unkräuter zum Zeitpunkt der Behandlung im aktiven Wachstum befinden.



### Brennnesseln

**0,3% (30 ml in 10 l Wasser)**

Im Frühjahr oder Herbst bei einer Wuchshöhe von 20-30 cm behandeln.



### Disteln

**0,5% (50 ml in 10 l Wasser)**

Im Frühjahr oder Herbst ab einer Wuchshöhe von 15-20 cm bis zur Knospenbildung behandeln.



### Brombeersträucher

**0,5% (50 ml in 10 l Wasser)**

Nach der Ernte bis zum Wintereinbruch behandeln. Behandelte Sträucher nicht vor dem nachfolgenden Winter schneiden.



### Blacken

**0,8-1% (80-100 ml in 10 l Wasser)**

Anwendung im Frühjahr oder Herbst, im Rosettenstadium der Blacken.

## So wirkt Picobello

Die **systemischen** Wirkstoffe Triclopyr und Clopyralid werden hauptsächlich über die Blätter aufgenommen und sehr schnell in der ganzen Pflanze verteilt. Neben den grünen Pflanzenteilen werden auch die Wurzeln zerstört und damit der **Wiederaustrieb verhindert**.



Reg. Warenzeichen der Omya (Schweiz) AG.  
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.