

 Austrieb	 Blütenknospen sichtbar	 Blüte	 Fruchtentwicklung	 Nach der Ernte/ Neupflanzung
---	---	--	--	---

UNKRAUTBEKÄMPFUNG

Einjährige Unkräuter und Ungräser	Nikkel 2,5l/ha			Mentor Uno 1,5–3l/ha	Im Herbst 2 Behandlungen mit Mentor Uno , erste Spritzung 14 Tage nach dem Pflanzen im Keimblattstadium der Unkräuter. Nach 8–10 Tagen Spritzung wiederholen. Bredola im September auf gut angewachsene Kulturen anwenden. Wenn notwendig, kann im Frühjahr beim Austrieb Nikkel eingesetzt werden.
			ÖLN-Restriktionen beachten	Bredola 1,5–2l/ha	
				Nikkel 2,5–3l/ha	
Unkräuter	Alopex 167 g/ha			Alopex 167 g/ha	Max. 1 Behandlung im Frühling vor der Blüte oder im Sommer nach der Ernte.
Ungräser	Ruga 2–6l/ha			Ruga 2–6l/ha	Wartezeit: 6 Wochen. 2,5–3l/ha gegen einjährige, 4–6l/ha gegen mehrjährige Ungräser.

KRANKHEITSKONTROLLE

Echter Mehltau	Taifen 0,6l/ha			Taifen 0,6l/ha	Taifen: Max. 3 Behandlungen pro Jahr mit Difenconazol oder SDHI-Fungiziden. Wartezeit: 1 Tag.
	Corsil 0,3 kg/ha			Corsil 0,3 kg/ha	Corsil und Amistar enthalten Strobilurine. Max. 3 Behandlungen pro Jahr mit Strobilurinen. Wartezeit 2 Wochen.
	Amistar 1l/ha			Amistar 1l/ha	
	Elosal Supra 2–4 kg/ha			Elosal Supra 2–4 kg/ha	Wartezeit 3 Tage.
	Heliosoufre S 2–4l/ha			Heliosoufre S 2–4l/ha	Heliosoufre S: Keine Anwendung von der Blüte bis zum Ende der Ernte.
Pilzliche Blattfleckenkrankh., eckige Blattfleckenkrankh.	Funguran Flow 1,5–2l/ha			Funguran Flow 1,5–2l/ha	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.
Graufäule	Espiro 2,5l/ha				Eine Behandlung mit Espiro während der Vollblüte durchführen. Wartezeit: 2 Wochen.
	Prolectus 1,2 kg/ha				Max. 2 Behandlungen mit Prolectus . Wartezeit: 3 Tage.

SCHÄDLINGSKONTROLLE

Spinnmilben	Milbeknock 1,25l/ha			Milbeknock 1,25l/ha	Milbeknock wirkt gegen alle beweglichen Stadien. Wartezeit: 1 Woche, max. 1 Behandlung pro Jahr.
	Majestik 25l/ha				Majestik: Wartezeit: 3 Tage.
Gemeine Spinnmilbe, Erdbeermilbe	Kiron 2l/ha			Kiron 2l/ha	Kiron wirkt gegen alle beweglichen Stadien. Wartezeit: 3 Wochen, max. 1 Behandlung pro Jahr.
Spinnmilben, Blattläuse	Siva 50 20l/ha			Siva 50 20l/ha	Gute Benetzung wichtig, Wirkung nur bei direktem Kontakt. Wartezeit: 1 Woche.
Thrips, Erdbeerblütenstecher	Audienz 0,2l/ha			Audienz 0,2l/ha	Wartezeit: 3 Tage, max. 2 Behandlungen pro Jahr.
Kirschessigfliege				Audienz 0,2l/ha	Anwendung in Fruchtreife. Max. 2 Behandlungen. Wartezeit: 3 Tage.
Schnecken	Steiner Gold 5 kg/ha				Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen. Max. 700 g Metaldehyd pro ha und Jahr auf der gleichen Parzelle.