

	Produkte	Dosierung /ha	Warte- frist	Wichtige Hinweise
--	----------	---------------	-----------------	-------------------

KLEEGRAS-NEUANLAGEN

Blacken	MCPB Omya	5l	3 Wochen	Bei mildem, wüchsigem Wetter spritzen, wenn der Klee drei echte Blätter aufweist.
Blacken und Hirtentäschel	MCPB Omya + MCPA Plus	2,5l 2l	3 Wochen	Gute Wirkung bis zum 2–4-Blatt-Stadium der Blacken.
Grössere Blacken	MCPB Omya + Ruman	4l 1l	3 Wochen	Wirkt auch gegen grössere Blacken. Spritzen, wenn der Klee vier echte Blätter hat. Spritzung muss nach ca. einer Woche wiederholt werden.
Blacken und verschiedene einjährige Samenunkräuter	MCPB Omya + Kusak SG	2l 0,8 kg	3 Wochen	Für alle Behandlungen in Klee-gras-Neuanlagen gilt: Luzerne, Perser-, Alexandriner- und Inkarnat- klee nicht behandeln.

WIESEN UND WEIDEN

Blacken	Ruman	4l	3 Wochen	Flächenbehandlung im Frühjahr auf gut entwickelte Blacken vor der Blütenstängelbildung.
	Hoestar	80 g		Flächenbehandlung im Spätsommer oder Herbst auf Blacken im Rosettenstadium.
	Simplex	0,5%		Einzelpflanzenbehandlung. Anwendung im Frühjahr oder Sommer bis Ende August auf Blacken im Rosettenstadium.
Grosse Brennnesseln	Picobello	0,3%	3 Wochen	Einzelpflanzenbehandlung. Behandlung im Frühjahr oder Herbst bei einer Wuchshöhe von 20–30 cm.
Disteln	Picobello	0,5%	3 Wochen	Einzelpflanzenbehandlung. Behandlung im Frühjahr oder Herbst bei einer Wuchshöhe von 15–20 cm bis zur Blütenknospenbildung.
Brombeersträucher	Picobello	0,5%	3 Wochen	Einzelpflanzenbehandlung. Behandlung nach der Erntezeit bis zum Wintereinbruch.
Adlerfarn, Wurm-farn, Alpen-Blacken	Ruman	6–8l	3 Wochen	Behandlung im Frühjahr oder Herbst.
Weisser Germer, Disteln, TW: Blacken	Plüsstar	1,5–2,5l		Flächenbehandlung. Anwendung vor der Neuansaat bei wüchsiger Witterung.
Stickstoff-Düngung	NovaTec 26	3–4 kg/a		NovaTec 26 zu Vegetationsbeginn oder nach dem ersten Schnitt streuen.

KLEE ZUR SAATGUTPRODUKTION

Kleespitzmäuschen	Audienz	0,2l	3 Wochen	Maximal eine Behandlung pro Jahr.
-------------------	----------------	------	----------	-----------------------------------

NICHTKULTURLAND

Brennnessel, Disteln, Brombeersträucher	Picobello	0,3–0,5%		Einzelpflanzenbehandlung an Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen.
Blacken, Giftige Kreuzkräuter, Japanknöterich	Simplex	0,5–1%		Einzelpflanzenbehandlung an Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen.

ZIER- UND SPORTRASEN

Unkräuter inklusive Weissklee, mit guter Teilwirkung gegen Ehrenpreis-Arten, Gundelrebe, Kriechender Günsel	Banvel M	4l		Aufgelaufene Unkräuter behandeln. Bei mildem und wüchsigem Wetter spritzen.
	Plüsstar	1,5–2l		
Hirsen	Puma extra	0,4–1l		Puma extra auf aufgelaufene Hirsenspritzen. Nach der Behandlung Rasen 7–10 Tage nicht mähen. Agrostis-Rasen nicht behandeln, keine Anwendung im Hausgarten.
Diverse Pilzkrankheiten	Amistar	1l		Maximal 3 Anwendungen.

Praxistipp für Futterbaubetriebe:

Bactériolit concentré ist ein pulverförmiger, organischer Kompostzusatzstoff für Mist und Gülle. Es fördert die biologische Umwandlung von Einstreu, Gülle, Mist, Kompost, Gärresten und weiteren organischen Stoffen zu Humus und verbessert die Effizienz des Hofdüngers.

Anwendung und Dosierung:

Bactériolit concentré wird von Hand direkt auf die Einstreu im Stall, auf den Miststock, in die Güllegrube, auf den Kompost oder Gärreste gestreut.

Es kann auch in den Güllewagen gepumpt werden (vor dem Gülleausbringen).

- 1–2 kg **Bactériolit concentré** pro m³ Mist oder Gülle.

- Die Dosierung ist so zu wählen, dass bei der Verteilung der Gülle und des Mistes 30–60 kg **Bactériolit concentré** pro ha und Jahr ausgebracht werden.