

# PRAIRIES ET PÂTURAGES, GAZONS

	Produits	Dosages /ha	Délai d'att.	Remarques
--	----------	-------------	--------------	-----------

## SEMIS MÉLANGES FOURRAGERS (TRÈFLES / GRAMINÉES)

Rumex	<b>MCPB Omya</b>	5l	3 sem	Traiter par temps doux et poussant, lorsque le trèfle a atteint 3 vraies feuilles.
Rumex et capselle bourse-à-pasteur	<b>MCPB Omya + MCPA Plus</b>	2,5l 2l	3 sem	Très bonne efficacité jusqu'au stade 2-4-feuilles des rumex.
Rumex plus développés	<b>MCPB Omya + Ruman</b>	4l 1l	3 sem	Agit aussi contre les rumex plus développés. Traiter dès que le trèfle a atteint 4 vraies feuilles. Répéter l'application après environ 1 sem.
Rumex et diverses dicotylédones annuelles	<b>MCPB Omya + Kusak SG</b>	2l 0,8 kg	3 sem	Pour toutes les applications sur des nouveaux semis de trèfles/graminées: ne pas traiter la luzerne, le trèfle de Perse, le trèfle d'Alexandrie et le trèfle d'incarnat.

## PRAIRIES ET PÂTURAGES

Rumex	<b>Ruman</b>	4l	3 sem	Au printemps sur toute la surface sur des rumex bien développés, avant la formation des fleurs.
	<b>Hoestar</b>	80 g		En fin d'été ou en automne sur toute la surface sur des rumex au stade rosette.
	<b>Simplex</b>	0,5%		Traitement plante par plante. Au printemps ou en été jusqu'à la fin août sur des rumex au stade rosette.
Orties dioïques	<b>Picobello</b>	0,3%	3 sem	Traitement plante par plante. Au printemps ou en automne sur des plantes mesurant 20-30 cm.
Chardons	<b>Picobello</b>	0,5%	3 sem	Traitement plante par plante. Au printemps ou en automne sur des plantes mesurant 15-20 cm jusqu'à la formation des fleurs.
Ronces	<b>Picobello</b>	0,5%	3 sem	Traitement plante par plante, après la récolte jusqu'au début de l'hiver.
Fougère impériale, dryoptéris, rumex	<b>Ruman</b>	6-8l	3 sem	Application au printemps et en automne.
Vératres blancs, chardons Effet partiel: rumex	<b>Plüsstar</b>	1,5-2,5l		Traitement de surface. Application avant le semis en cas de conditions favorables à la croissance.
Fumure azotée	<b>NovaTec 26</b>	3-4 kg/a		Épandre <b>NovaTec 26</b> à la début de végétation ou après la 1 <sup>ère</sup> coupe.

## TRÈFLES POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES

Apions du trèfle	<b>Audienz</b>	0,2l	3 sem	Max. une application par année.
------------------	----------------	------	-------	---------------------------------

## ZONES NON CULTIVÉES

Chardons, orties dioïques, ronces	<b>Picobello</b>	0,3-0,5%		Traitement plante par plante sur les talus et bandes vertes le long des voies de communication.
Rumex, séneçons toxiques, renouée du Japon	<b>Simplex</b>	0,5-1%		Traitement plante par plante sur les talus et bandes vertes le long des voies de communication.

## GAZONS DE SPORT ET D'ORNEMENT

Dicotylédones, trèfles blancs inclus, avec un bon effet partiel contre véroniques, lierres terrestres, bugles rampants	<b>Banvel M</b>	4l		Appliquer sur des mauvaises herbes levées. Traiter par temps doux et poussant.
	<b>Plüsstar</b>	1,5-2l		
Millets	<b>Puma extra</b>	0,4-1l		Appliquer <b>Puma extra</b> sur des millets levés. Ne pas tondre le gazon durant les 7-10 jours suivant l'application. Ne pas appliquer sur gazons composés d'agrostides et dans les jardins familiaux.
Diverses maladies fongiques	<b>Amistar</b>	1l		Max. 3 applications.

### Conseils pratiques pour les exploitations fourragères :

**Bactériolit concentré** est un additif de compostage organique pour les fumiers et les lisiers. Il active la transformation de la litière, du lisier, du fumier, du compost, du digestat et autres matières organiques en humus et améliore leur efficacité.

#### Utilisation et dosage :

Épandre **Bactériolit concentré** à la main directement sur la litière, le fumier, le lisier, le digestat ou le compost. Il peut également être ajouté dans la citerne à lisier (avant l'épandage).

- 1-2 kg de **Bactériolit concentré** par m<sup>3</sup> de fumier ou lisier.

- Le dosage doit être choisi de manière à épandre 30-60 kg de **Bactériolit concentré** par ha et par an lors de l'épandage du lisier et du fumier.